



トマト編



病害虫注意報
2017年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

トマトサビダニ特集

極めて微小で、目には見えない害虫です。
発生に注意して予防散布を心がけましょう！

このような症状に注意！



光沢のある葉裏



くすんだ黄褐色の茎

温度	発育日数 (日)		
	卵	幼虫～若虫	合計
15℃	8.3	8.8	17.1
25℃	3.1	2.4	5.5
30℃	2.2	2.4	4.6

たった5日で卵～成虫に！

25℃では、1匹の比率は約7割で、
約25日の寿命中に1匹あたり約50卵
産みます！

今月のおすすめ トマトサビダニ・コナジラミ類 防除ローテーション

コナジラミ類 トマトサビダニ
ミカンイロアザミマ ハメグリハエ類
ハスモンヨトウ オオハバコガ

マツチ乳剤 1,000～3,000倍 前日/4回 1日

※総使用回数に注意！

※コナジラミ類・トマトサビダニは2,000倍、ハメグリハエ類は1,000倍
ミカンイロアザミマは1,000～2,000倍、ハスモンヨトウは3,000倍
オオハバコガは2,000～3,000倍

コナジラミ類
トマトサビダニ
ハメグリハエ類

コロマイト乳剤 1,500倍 前日/2回 1日

マハメグリハエ
トマトサビダニ
オオハバコガ

アフアーム乳剤 2,000倍 前日/5回 1日

トマトサビダニ
コナジラミ類

アプロードエースフロアブル 1,000～2,000倍 前日/3回 1日
※トマトサビダニは1,000倍

草勢維持！バテない株に！今月のおすすめ資材

ファイトオーツ

1,000倍 葉面散布

光合成能力の向上！
毛細根の充実！

肥料登録：生第83241号



ファイトメット

酵母由来のアミノ酸

メチオニン

キトサンオリゴ糖

100～150g/10aを
10～14日おきに灌注処理

肥料登録：生第84050号



NEW SB酸素

土壌に酸素を供給！
根の活動を活発に！

5～10kg/10aを目安に
7～10日おきに灌注処理

※交互に使うとより効果的！

