



イチゴ編



病害虫注意報
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

苗床での病害虫発生を防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！

親株床おすすめローテーション

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数		
						ミハチ	マルハチ	
5月 ①	炭疽病 芽枯病 灰色かび病	ホーサイト水和剤80	予	800倍	30日前	3回	1日	0日
	ハダニ類 シラミ科リダニ ハスモンヨトウ ミカンイロアザミウマ	コテツプロアブル	速 成虫 幼虫	2,000倍	前日	2回	10日	9日
5月 ②	炭疽病 うどんこ病	サンリット水和剤	予・治	2,000 ~4,000倍	前日	3回	—	—
	ハダニ類・アブラムシ類 コガネムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	速 成虫 幼虫	1,000倍	前日	—	—	—
5月 ③	炭疽病 じゃのめ病	ジマダイト水和剤	予	600倍	仮植栽培期 但し収穫76 日前まで	6回	3日	0日
	ハダニ類 アブラムシ類 ミカンイロアザミウマ	アデント水和剤	速 成虫 幼虫	1,000倍	前日	4回	2日	3日
5月 ④	炭疽病	ゲッター水和剤	予・治	1,000倍	収穫開始 21日前 まで	3回	0日	1日
	ハダニ類・アブラムシ類 コガネムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	速 成虫 幼虫	1,000倍	前日	—	—	—

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

ハダニ類

徹底防除のポイント！



- 薬剤は、葉裏を中心に たっぴり散布する
- 発生予防のため、定期的に薬剤を散布する
- 気門封鎖剤を活用し、抵抗性の獲得を防ぐ
- 本圖で使う薬剤は極力使用しない

おすすめ資材



ファイトオーツ
1,000倍

肥料登録：生第83241号

10日おきに2~3回
葉面散布で
すんぐり苗に！
ランナーの充実にも！



ファイトメット
2,000倍

肥料登録：生第84050号

10日おきに2回
株元灌注で
毛細根を充実！