



トマト編



病害虫注意報
2017年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

黄化葉巻病(TYLCV)特集



芽先が黄化・葉巻症状になり、
節間がつまる。



タバココナジラミ幼虫



タバココナジラミ成虫

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、
コナジラミ類の飛び込みが増えます。
コナジラミによる黄化葉巻病の発生が
多くなる時期ですので注意しましょう！

発病株全体にウイルスが広がっています。
芽先をピンチするだけでは新たな保毒虫が
増えるため、被害が拡大します！

黄化葉巻病感染株は株ごと
早急に除去しましょう！！

★タバココナジラミ(バイタイプB,Q)によって媒介されるのでコナジラミ類の防除を徹底しましょう！

今月のおすすめコナジラミ類・灰色かび病 防除ローテーション

薬害回避のために、高温時・多湿時の散布は控え、夕方までにきちんと乾かしましょう！

コナジラミ類 アザミマ類 ハゲグリバエ類 ハシモンヨトウ オタバコガ	ディアナSC 2,500~5,000倍 前日/2回 1日 ※コナジラミ類は2,500倍
灰色かび病	【予】セイビアーフロアブル20 1,000~1,500倍 前日/3回

コナジラミ類 トマトバグ	アプロードエースフロアブル 1,000~2,000倍 前日/3回 1日 ※トマトバグは1,000倍 ※総使用回数に注意！
灰色かび病 葉かび病	【予】ベルコート水和剤 3,000~6,000倍 前日/3回

コナジラミ類 アザミマ類 アブラムシ類	モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍 前日/3回 1日
灰色かび病 葉かび病 うどんこ病 すずかび病 菌核病	【予・治】シグナムWDG 2,000倍 前日/2回 ※総使用回数に注意！

おすすめ薬剤

フーモン



有効成分がすばやく害虫を
包囲し、気門封鎖で窒息死
させます！

【登録内容】
アブラムシ類、ハダニ類
コナジラミ類、うどんこ病
1,000倍/収穫前日
回数制限なし

今月のおすすめ資材

ファイトマジック



キレートマグネシウム
+各種微量元素

1,000倍/葉面散布

- ◆葉と根の充実
- ◆葉の伸・テリ・厚み向上

肥料登録:生第87201号

18啞リン酸カリ液

啞リン酸カリ肥料 0-29-19
1,000~2,000倍 葉面散布

0.5~1L/10a/回 灌注

- ※週1回の灌注がお勧め
- ◆リン酸吸収UP
- ◆花芽の充実

肥料登録:輸第13355号

