



スイートコーン編



病害虫注意報
2017年7月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫対策

雌穂侵入前に防除!!

アワノメイガやオオタバコガは雌穂内に侵入して作物を食害します。
雌穂内へ侵入後は薬剤がかからず、期待する防除効果が得られません。
雄穂の食害中や、孵化直後の雌穂に侵入する前に、薬剤を散布して適期防除しましょう!

薬剤名	希釈倍率	日数/回数	適用病害虫	ヤングコーンでの使用
アグロスリン乳剤	1000~2000倍	7日前/3回	アワノメイガ [*] 、アワヨトウ(1000倍) アブラムシ類(2000倍)	×
アフーム乳剤	1000~2000倍	3日前/2回	オオタバコガ [*] 、ヨウムシ	○ 前日/2回
カスケード乳剤	2000~4000倍	7日前/2回	アワノメイガ [*] 、オオタバコガ [*] (4000倍)	×
ゼンターリ顆粒水和剤	1000倍	前日/-	オオタバコガ [*]	○ 前日/- (野菜類登録)
トレボン乳剤	1000倍	7日前/4回	アワノメイガ [*] 、アワヨトウ	×
プレバソンフロアブル5	2000倍	前日/3回	アワノメイガ [*] 、オオタバコガ [*]	×
フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	前日/2回	アワノメイガ [*] 、オオタバコガ [*]	○ 前日/2回
粒剤 パダン粒剤4	6kg/10a 株の上から均一に撒粒する。	7日前/2回	アワノメイガ [*]	×

※スイートコーンとヤングコーンは登録内容が異なります。使用前に必ずラベルをご確認ください。

とうもろこしを食害するチョウ目害虫の特徴

害虫名	主な食害部	発生回数/年	体長(老齢幼虫)
アワノメイガ	茎・雄穂・雌穂・子実	3回程度	約25 mm
アワヨトウ	葉(中肋を残す)・子実	3~4回程度	約35 mm
オオタバコガ	雄穂・雌穂・絹糸・子実	2~3回程度	約40 mm

登録内容再確認!

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が違います!

スイートコーン

とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ベビーコーン

ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

要注意!!

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数とは、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。