



ハクサイ編



病害虫注意報
2017年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白斑病・アブラムシ類・チョウ目害虫防除特集

白斑病	感染→発病まで約3～16日 多雨の年に多発
アブラムシ類	温暖な気候が続くと多発
チョウ目害虫	シロイチモジヨトウが多発 チョウ目害虫全般やや多い

白斑病の防除



結球初期に発病しやすい

約3～16日

病斑確認



防除は病斑未確認時から実施

白斑病・アブラムシ類同時防除ローテーション


予防
 白斑病 黒斑病 べと病 白さび病
ダコニール1000 1,000倍 7日前/2回
コルト顆粒水和剤 4,000倍 3日前/3回

予・治
 白斑病 黒斑病 菌核病 白さび病
シグナムWDG 1,500～2,000倍 7日前/3回 (菌核病は1,500倍)
アルバリン顆粒水溶剤 2,000～3,000倍 3日前/2回 (キスジノミハムシは2,000倍)

予・治
 白斑病 菌核病
ベンレート水和剤 2,000～3,000倍 7日前/2回
アブラムシ類 コナガ・アオムシ ヨトウムシ
ランネット45DF 1,000～2000倍 14日前/2回

予防
 白斑病 黒斑病 菌核病
アフェットフロアブル 2,000倍 前日/3回
ハチハチフロアブル 1,000～2,000倍 14日前/2回 (アブラムシ類以外は1,000倍) ハチハチは幼苗期使用不可
アブラムシ類・コナガ・アオムシ ハイマダラノメイカ・キスジノミハムシ ダイコンサルハムシ

チョウ目害虫多発時おすすめ薬剤

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数
ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
トルネードエースDF	1,000～2,000倍	7日前	2回
アフーム乳剤	1,000～2,000倍	7日前	3回
プレオフロアブル	1,000倍	7日前	2回
フローバックDF	1,000倍	発生初期 (但し、収穫前日まで)	-

おすすめ資材

肥料登録：生第91402号

強風・強雨後のケアに！
カテキンパワー
1,000倍 葉面散布

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。



亜リン酸だから速効性！ 肥料登録：輸第9423号

エレマックス赤
N-P-K=0-28-26 1,000倍 葉面散布

植物の病害抵抗性を向上、未消化窒素の低減

