



ブロッコリー編



病害虫注意報
2017年11月作成

※農薬はラベルの記載に従って使用してください。

べと病・黒腐病特集！

べと病



葉の症状



花蕾基部の症状

症状

葉裏・花蕾などの黒変、汚白色のかび

多発条件

連続する降雨、長時間の植物の濡れ

黒腐病



葉の症状



維管束の黒変

症状

葉縁のV字型病斑、維管束の黒変

多発条件

低温期の降雨、虫害の酷い圃場(傷口)

べと病・黒腐病防除薬剤

べと病予防には花蕾形成前の防除を徹底！

対象病害	薬剤名	予防・治療	希釈倍数	収穫前日数/回数	
べと病	ランマンフロアブル	予防	2000倍	収穫3日前まで/3回以内	
	レーバフロアブル	予防	2000倍	収穫7日前まで/2回以内	
	ライメイフロアブル	予防	2000倍	収穫7日前まで/4回以内	
	アミスター20フロアブル	予防・治療	2000倍	収穫3日前まで/3回以内	
	シグナムWDG	予防・治療	1500~2000倍	収穫14日前まで/1回	
	ダコニール1000	予防	1000倍	出蕾前(但し、収穫21日前まで)	散布は 合計2回以内
	フォリオゴールド	予防・治療	1000倍	出蕾前(但し、収穫21日前まで)	
黒腐病	キノドー水和剤40	予防	800倍	収穫14日前まで/3回以内	
	カッパーシン水和剤	予防・治療	1000倍	収穫21日前まで/4回以内	
べと病 黒腐病	ヨネポン水和剤	予防	500倍	収穫前日まで/4回以内	

病害に負けない樹勢の維持に！

エレマックス赤

1000倍

肥料登録：輸第9423号

「亜りん酸」配合 N-P-K=0-28-26

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤との混用は避けてください。



新規薬剤情報 2017年7月18日新規登録

ピシロックフロアブル

べと病 1000倍/収穫前日まで/2回以内

新規有効成分ピカルブトラゾクス

優れた予防効果と浸達性！

