



# イチゴ編



病害虫注意報  
2017年12月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫で忙しい時期ですが 病害虫蔓延を防ぐために 初期防除を心掛けましょう！

## 収穫中 おすすめローテーション

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数			
						ミツ バチ	マルハ バチ	ミカ ド	刊
12月 ①	灰色かび病 うどんこ病	カリグリーン ※野菜類登録	800~1,000倍 ※灰色かび病は800倍	前日	-	0日	0日		
	ハダニ類・コナジラミ類 チャホコリダニ	サポール乳剤 ※野菜類登録	300~500倍 ※コナジラミ類・チャホコリダニは300倍	前日	-	1日	-	1日	天敵注意!
12月 ②	うどんこ病 灰色かび病	フルビ°かくん煙剤	50g(1錠)/500m <sup>3</sup> くん煙 10~15時間	前日	3回	1日		0日	
		フルビ°カローアブル	2,000~ 3,000倍						
	ハダニ類	ニツラン 水和剤	2,000倍~ 3,000倍	前日	2回	0日	1日	0日	
12月 ③	灰色かび病 うどんこ病	アグロア水和剤 ※野菜類登録	1,000~ 2,000倍	前日	-	0日		-	
	ハダニ類	マイルトネ アブル	1,000倍	前日	2回	1日		0日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

### 適用拡大農薬

イチゴにも登録拡大されました！  
浸達性・浸透移行性に優れています。

## オルフィンアブル



- ◆ 新規殺菌剤フルビ°ラム配合
- ◆ 対象病害：うどんこ病・灰色かび病
- ◆ 2,000~3,000倍
- ◆ 前日/1回

### おすすめ資材

果実の肥大・花芽分化にはコレ！  
肥大事例が続々と報告されています。

## DINAアロリン号



- ◆ アロリン(アミノ酸)・核酸を配合
- ◆ 2週間毎に施用
- ◆ 灌注処理  
500ml/10a

花芽分化の充実！窒素代謝の促進に！



## Eマックス赤

- ◆ 10日おきに2回 肥料登録：輸第9423号
- ◆ 葉面散布1,000倍

光合成量の少なくなるこの時期に！



## ペンタキーHyper5000

- ◆ 1~2週間おきに施用
- ◆ 葉面散布 5,000~7,000倍
- ◆ 根圏施用 100~200ml/10a