



キク編



病害虫注意報
2017年12月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病・病害虫・発生注意！

夜間カーテンを閉めるため、湿度が高くなります。高い湿度が続くと白さび病の発生に繋がりますので、夜間暖房機が回らない場合モヤコン等を使い、湿度を下げるように努めましょう。その他の病害虫についても引き続き発生します。ご注意ください。

今月のおすすめ ローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては被害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

生育
初期

白さび病	ペンコゼブフロアブル	800倍 発病前～発病初期/ 8回
ヨトウムシ類、アザミウマ類 アブラムシ類、ハダニ類	マラソン乳剤	2,000～3,000倍 発生初期/6回



破蕾
期

白さび病	ラリー乳剤	3,000倍 発病初期/5回
ハダニ類、 ハモグリバエ類	コロマイト 乳剤	1,500倍 —/2回
アブラムシ類 アザミウマ類	アドマイヤー フロアブル	2,000倍 発生初期/5回

消灯時

白さび病	Inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回
アブラムシ類 ヨトウムシ類 ハダニ類	アーデント水和剤	1,000倍 発生初期/5回

発蕾期

白さび病 うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	1,000～2,000倍/発生・発病初期/6回 (白さび病・アブラムシ類は1,000倍、 うどんこ病は2,000倍)
ハダニ類	カネマイト フロアブル	1,000～1,500倍 —/1回



Inochio オペラフラワー®乳剤

白さび病の対策に…

2000倍 発病初期/3回

inochio オペラフラワー®乳剤は、ストロビルリン(strobilurin)系のピラクロストロピンを有効成分とする新規殺菌剤です。

置らくじゃん

暖房機の準備の時に吹出口に
設置しましょう！

芳香性環境保護液

(成分: 桂皮油、ユーカリ油)

- 人体、環境に安全な天然成分
- 2～4個/10a



散布用
「おきらくじゃん103」
もオススメ！