



イチゴ編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年1月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

春先の病害虫蔓延を防ぐために 定期的な防除を心掛けましょう！

収穫中 おすすめローテーション②

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハチバチ	ミカ	刊
1月 ①	うどんこ病 灰色かび病	カクグリーン ※野菜類登録	800~ 1,000倍 ※ 灰色かび病は800倍	前日	—	0日		0日	
	ハダニ類 コナジラミ類 チャホリダニ	サフオイル乳剤 ※野菜類登録	300~ 500倍 ※コナジラミ類・チャホリダニは300倍	前日	—	1日		1日	天敵注意
1月 ②	うどんこ病 灰色かび病	ホフイン アロアブル	2,000~ 3,000倍	前日	1回	1日		—	
	ハダニ類	タニサハ アロアブル	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
1月 ③	うどんこ病	セナデ水和剤 汚れ注意	2,000倍	発病前~ 発病初期 まで	—	0日		—	
	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類 うどんこ病	アモン	1,000倍	前日	—	1日		1日	天敵注意

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

紅花由来の気門封鎖剤・殺虫剤

サフオイル乳剤

- ◆ 対象害虫：ハダニ類、コナジラミ類、チャホリダニ
- ◆ 300~500倍/前日
- ◆ 殺卵活性も認められます
- ◆ 展着剤の混用をオススメします

連続出蕾による成り疲れの対策に！



ファイトオーツ

- ◆ 葉面散布1,000倍
- ◆ 農薬・肥料との混用可能

肥料登録：生第83241号

根張りの弱くなる冬季・収穫期にも
新しい根を出すチカラを！



ファイトメット

- ◆ 灌注処理100~150g/10a
- ◆ 10~14日おきに3~4回

肥料登録：生第84050号

新年の御挨拶

あけましておめでとうございます。本年も皆様の作物の健康をお守りするため、病害虫等に関する情報をお届け致しますので、今後ともよろしくお願い致します。

