



イチゴ編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

作終盤の病害虫の蔓延を防ぐために 引き続き定期的な防除をしましょう！

収穫中 おすすめローテーション③

時期	対象 病害虫	薬剤名	倍率	使用 時期	回数	影響日数			
						ミツ バチ	マルハ バチ	ミカ	刊
薬剤 散布前	葉かきをしっかり行い、薬剤のかかりを良くしましょう								
2月 ①	うどんこ病	ガッテン乳剤		5,000倍	前日	2回	0日	0日	
	ハダニ類	マイトコーネ フロアブル		1,000倍	前日	2回	1日	0日	
1～ 2月頃	ハダニ類	【天敵】スパイデックス（刊ガリガニ）100ml 3本／10a ・ 天敵導入後10～14日間は、葉かき 及び 薬剤散布 は控え、天敵の定着を促しましょう ・ ダニが多い圃場は、2週続けて天敵を導入しましょう							
2月 ②	うどんこ病 灰色かび病	カリグリーン ※野菜類登録		800～ 1,000倍	前日	—	0日	0日	
	※ 灰色かび病は800倍								
	ハスモンク アザミウマ類	カウンター乳剤	 	2,000倍	前日	4回	1日	0日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

おすすめ資材

葉先・果実の先までカルシウムを！

有機酸とトレハロースによる Wキレート化で
カルシウムの吸収性を向上させます！



ファイトカル

- ◆ 1000倍
- ◆ 10～14日おきに葉面散布
- ◆ 展着剤代わりにも！



今月の防除ポイント

ハダニ対策に【天敵】スパイデックス
の春放飼を行いましょう！！

また、アザミウマは1度発生してしまうと、
防除が難しくなります。そのため、サイドや
天窓を開ける前に、
ハウス周りの除草を
しましょう！圃場内
への飛び込みを未然
に防ぐ事が大切です。

