



キク編



病害虫注意報
2018年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病注意！

1月の中旬頃から日射量も増えてきており、日中のハウス内は温度が上がっています。また、親木ハウスは株が混みあい、白さび病の発見が遅れやすくなります。定期的に防除し、感染穂を持ち込まないように十分注意しましょう。まだ病害虫の発生が見られない方も、防除を行っていきましょう。

今月のおすすめ ローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

生育初期

| | | |
|-------------------------------|----------|-------------------|
| 白さび病、アブラムシ類 アザミウマ類、ハモグリバエ類 | ハチハチ乳剤 | 1000倍 発病・発生初期/4回 |
| ハダニ類 | ニッソラン水和剤 | 2,000~3,000倍 -/2回 |

破蕾期

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---|
| 白さび病 黒斑病、ハダニ類 灰色かび病 うどんこ病 | ポリオキシソ AL水溶剤 | 2,500倍 発病・発生初期/8回 |
| ナミハダニ | マイトコーネ フロアブル | 1,000倍 開花前/1回 |
| アザミウマ類、コガネ 類、ハモグリバエ類、 オオタバコガ | ディアナSC | 2,500~5,000倍 発生初期/2回 (コガネ類: 2,500倍) |

消灯時

| | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| 白さび病 | Inochio オペラフラワー乳剤 | 2,000倍 発病初期/3回 |
| アブラムシ類 コガネ類、アザミウマ ハダニ類 | アーデント水和剤 | 1,000倍 発生初期/5回 |

発蕾期


| | | |
|---------------|------------|----------------------|
| 白さび病 | ラリー乳剤 | 3,000倍 発病初期/5回 |
| ハダニ類 | カネマイトフロアブル | 1,000~1,500倍 -/1回 |
| アザミウマ類、オオタバコガ | プリンスフロアブル | 2,000倍 発生初期/5回 |

白さび病の対策に...

Inochio
オペラフラワー®乳剤
2000倍 発病初期/3回

inochio オペラフラワー®乳剤は、ストロビルリン(strobilurin)系のピラクロストロピンを有効成分とする新規殺菌剤です。

◎耐性菌を作らないおすすめ散布法



オペラフラワーの散布後の少なくとも2回は異なる系統(ストロビルリン系以外)の農薬を使う。