



トマト編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年2月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

灰色かび病・葉かび病 特集



質問：灰色かび病が発生したので治療効果のある薬剤を散布したのですが、あまり良くなりません…なぜでしょうか？

答え：それは、**灰色かび病薬剤耐性菌**が発生している可能性があります！

Aグループ	Bグループ	Cグループ
ベルコート トップジンM	ロバラール スミレックス	スミブレント ゲッター

耐性菌の種類には3つの型があり、その型に合った薬剤を散布しないと全く効果がありません！

イノチオでは右記A～Cグループの薬剤に対し、皆様の圃場に発生している灰色かび病菌が耐性菌かどうか検定を実施しています。

※この時期は成り疲れになりやすく樹勢が低下していますので、樹勢に応じた管理を行いましょう。

(適切な灌水管理、温度管理、摘果(花)管理等)

※いずれも多湿条件下で発生が助長されます。適切な温度・湿度管理を行いましょう。

※葉かび病抵抗性品種でもすすかび病は発生しますので、ご注意ください。



今月のおすすめ 灰色かび病・葉かび病 同時防除ローテーション



光合成能力UP！

ファイトマジック

マグネシウムと微量元素

を速やかに補給！

1,000倍 葉面散布

肥料登録：
生第87201号

ペンタキープHyper

新成分 アルギニン

で吸肥力UP！

5,000倍 葉面散布

草勢維持！バテない株に！

ファイトメット

◆毛細根を増やし、活力UP！

酵母由来のアミノ酸

メチオニン

キトサンオリゴ糖

肥料登録：
生第84050号

100～150g/10aを
10～14日おきに灌注処理

NEW SB酸素

◆土壌に酸素を供給！

5～10kg/10aを目安に
定期的(7～10日おき)に灌注処理！

交互に使うとより効果的！

登録削除農薬情報

ジャストフィットフロアブル

2018年1月17日付 登録削除

新規登録農薬情報

トランスフォームフロアブル

平成29年12月25日付 新規登録

アブラムシ類、コナジラミ類

1,000～2,000倍/前日/2回

アブラムシ類は2,000倍

マルハナバチ：2日

※発売は2月を予定

殺虫剤