



キク編



病害虫注意報
2018年3月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

白さび病注意！

ハウス内の温度が上昇します。3月後半の曇天や雨の夜は暖房機が稼働せず、湿度の高い日も出てきますので、さび病対策をしっかり行いましょう。また、ハウス周りの雑草も成長をはじめます。草が大きくなると除草剤の散布が大変になりますので小さいうちに枯らすようにしましょう。

今月のおすすめ ローテーション

※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合がありますためご注意ください。展着剤、葉面散布剤などを加用する場合もご注意ください。

生育
初期

白さび病	inochio オペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回
ヨトウムシ類、アザミウマ類 アブラムシ類、ハダニ類	マラソン乳剤	2,000~3,000倍 発生初期/6回

破蕾期

消灯時

白さび病 うどんこ病	アンビル フロアブル	1,000倍 発病初期/7回
ミナトヤブガミマ ハダニ類	アグリメック	500倍 発生初期/5回
アブラムシ類 コナジラミ類	コルト 顆粒水和剤	4,000倍 発生初期/4回

さび病、炭疽病 灰色かび病 べと病	エムダイファー 水和剤	400~650倍 発病初期/8回
ハダニ類 アブラムシ類	サンマイル フロアブル	1,000倍 -/2回
アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ	スピノエース 顆粒水和剤	5,000倍 発生初期/2回 オオタバコガは 2,500~5,000倍

発蕾期

白さび病、灰色かび病	アフエットフロアブル	2,000倍 発病初期/3回
ハダニ類 ハモグリバエ類	コロマイル乳剤	1,500倍 -/2回
アザミウマ類、アブラムシ類 ハモグリバエ類、カメムシ類	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍 発生初期/4回

白さび病の対策に... Inochio オペラフラワー®乳剤

2000倍 発病初期/3回

inochio オペラフラワー®乳剤は、ストロビルリン(strobilurin)系のピラクロストロピンを有効成分とする新規殺菌剤です。

暖房機が稼働しにくい時は...

4段サーモヤコン

これ1台で4段変温はもちろん、モヤコン機能により多湿環境を改善します。

