



ミニトマト編



病害虫注意報
2018年4月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

トマトサビダニ特集 **このような症状に注意!**

極めて微小で、目には見えない害虫です。気象条件も良く、生育が旺盛になり作業管理に追われるこの時期によく目にします。発生に注意して予防散布を心がけていきましょう!



温度	発育日数(日)		
	卵	幼虫~若虫	合計
15℃	8.3	8.8	17.1
25℃	3.1	2.4	5.5
30℃	2.2	2.4	4.6

たった5日で卵~成虫に!

25℃では、卵の比率は約7割で、約25日の寿命中に1羽あたり約50卵産みます!

今月のおすすめ 防除ローテーション

コナジラミ類 トマトサビダニ
ミカンキイロアザミヤ
ハモンヨウ 材カビコガ

マツチ乳剤

2,000~3,000倍 前日/2回 1回/1日
※コナジラミ類・トマトサビダニ・ミカンキイロアザミヤは2,000倍
ハモンヨウは3,000倍

コナジラミ類
トマトサビダニ
ハモグリバエ類

コロマイト乳剤
1,500倍 前日/2回 1回/1日

トマトサビダニ
ハダニ類

マイトコーネフロアブル
1,000倍 前日/1回 1回/1日

トマトサビダニ コナジラミ類
アブラムシ類、ハダニ類
うどんこ病

サンクリスタル乳剤 300~600倍 前日/-回 1回/0日
※コナジラミ類、アブラムシ類は300倍
混用注意・サビダニ系の剤との近接散布不可(前後2週間)

暖かくなり、コナジラミ類等の害虫の活動も活発になります。早めの対策を行っていきましょう!

登録内容変更情報

ダニトロンフロアブル

※使用時期変更!

使用時期/収穫前日まで

↓
収穫開始14日前まで

ご注意ください!

先月に引き続き!

光合成能力UP! 葉焼け・尻腐れ対策に!

ペンタキープHyper



新成分アルギニン配合で
さらに吸肥力UP!

5,000倍 葉面散布

おすすめは、
2週間おき3回以上!

ファイトカル



Wキレート化でカルシウム
の吸収性を向上!

展着剤代わりに!

1,000倍 葉面散布

おすすめは、
10日~14日おき!

