



メロン編



病害虫注意報
2018年5月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

外気温度がだんだんと高くなってきています。
害虫の飛込みが増加し、曇雨天が続くと
つる枯病も発生しやすい時期です！

交配前おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	ミツバチ
1	つる枯病、陥没病	予・治 トップジンM水和剤	1,500~2,000	前日	3回	なし
	アザミヤマ類、ハダニ類 コナジラミ類	速 アグリメック	500~1,000	前日	3回	14日
2	つる枯病 うどんこ病	予 ネクスターフロアブル	1,000	前日	3回	なし
	ハダニ類、コナジラミ類 アブラムシ類、アザミヤマ類	遅 モベントフロアブル	2,000	前日	3回	1日
3	うどんこ病、つる枯病 アザミヤマ類、ハダニ類	予・治 ポリオキシシンAL水溶剤	1,000~2,000	前日	5回	3日
	アブラムシ類、コナジラミ類 ミメキロアザミヤマ ウリメカガ	中 バリアード顆粒水和剤	2,000~4,000	前日	3回	1日
4	うどんこ病、つる枯病	予・治 スコア顆粒水和剤	2,000	前日	3回	なし
	アブラムシ類、コナジラミ類	遅 ウララDF	2,000~4,000	前日	2回	なし

※アザミヤマ類、ハダニ類は2,000倍
※アブラムシは4,000倍、ウリメカガは2,000倍
※コナジラミ類は2,000倍

つる枯病にご注意ください！

曇天・降雨が続くと
つる枯病が発生しやすくなります！

★こんな症状出ていませんか？

- ①葉が褐変し、表面に小黑点がある
- ②地際部やつるの一部が褐変している



もしも発生してしまったら
塗布剤が効果的です！

トップジンM ペースト

原液を塗布
(発病初期/1回)
※収穫21日前



ポリオキシシン AL水溶剤

10~50倍液を塗布
(7日前/1回)
※散布と合わせて5回以内



ファンベル顆粒水和剤

つる枯病、うどんこ病、
菌核病
1,000倍 前日/5回



ピクシオDF

菌核病
2,000倍 前日/3回

登録適用拡大情報