



スイカ編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年6月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。




うどんこ病、ハダニ類の発生に注意！

発生が増える時期です。多発する前にしっかりと防除しましょう！

交配後2週間は農薬
散布を避けましょう！

今月のおすすすめローテーション



高温による悪変果に注意しましょう！

黄帯(スジ)果



高温・乾燥の年で、着果過多などの際、**カルシウム(石灰)・ホウ素**の吸収が阻害により発生。

こんにゃく果



果実が高温・直射日光により発生する。灌水を行い、果実が高温になり過ぎないように葉や萼で覆う。

おすすめ資材

ファイトカル + ファイトマジック



果実肥大期に7～10日おきに
葉面散布を！

注意！

以下のものとは混用できません！！

ストロビルリン系(アミスター、ストロビー、シグナムなど)、無機銅(カッパーシン、Zボルドーなど)、ホルモン剤、微量要素入り葉面散布剤、液肥類

おすすめ薬剤

プロパティフロアブル

有効成分:ピリオフェノン うどんこ病 ミツバチ影響なし
使用倍率: 3,000～4,000倍 収穫前日/3回

うどんこ病菌の様々なステージ、各種うどんこ病に作用！

胞子形成を強く阻害し、菌密度を効率よく抑制！

マルチスプレッド効果により成分が速やかに葉内で拡散！



うどんこ
対策