



露地ナス編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年7月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫が発生しやすい時期です！

老令幼虫になると薬剤が効きにくくなります。
発生状況を確認して、早めの防除を心がけましょう！



ゲリラ豪雨、強い台風に注意！

大雨や強風によって、病気の蔓延が懸念されます。雨前後にはしっかり防除を行いましょう！

大雨や台風通過後の対処に！

【SB酸素】
5～10kg/10a
灌注



【ファイトオーツ-1,000倍】+
【エレマックス赤1,000倍】
葉を洗い流すようにしっかり
葉面散布



おすすめローテーション

時期	対象病害虫	薬剤名	倍率	回数	その他
①	ハモグリバエ類・ハスモンヨトウ・オオタバコガ	プレバゾンフロアブル5	1000倍 ～2000倍	前日/2回	ハスモンヨトウ・オオタバコガ：2000倍
	ミカンキイロアザミウマ・ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ・オオタバコガ・チャノホコリダニ・ヨトウムシ・ハスモンヨトウ・テントウムシダマシ類	コテツフロアブル	2000倍	前日/4回	※4葉期以降の使用
②	ハダニ類・チャノホコリダニ・アザミウマ類・アブラムシ類・コナジラミ類	モベントフロアブル	2000倍	前日/3回	
	すすかび病・うどんこ病・黒枯病・灰色かび病	ダコニール1000 予	1000倍	前日/4回	
③	コナジラミ類・ハダニ類・アザミウマ類	アグリメック	500倍 ～1000倍	前日/3回	
	アブラムシ類・コナジラミ類・テントウムシダマシ類・アザミウマ類	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍 ～4000倍	前日/3回	コナジラミ類：2000倍 テントウムシダマシ類・アブラムシ類：4000倍
④	オオタバコガ・コナジラミ類・チャノホコリダニ・ハスモンヨトウ・ハモグリバエ類	アニキ乳剤	1000倍 ～2000倍	前日/3回	ハモグリバエ類・オオタバコガ・チャノホコリダニ：2000倍
	褐色腐敗病	ランマンフロアブル 予	2000倍	前日/4回	