



ブロッコリー編



病害虫注意報
2018年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

ハスモンヨトウ・シロイチモジヨトウ対策

ハスモンヨトウ



シロイチモジヨトウ



- 成虫は卵塊（数百個）で産卵する
- 酷い食害を受けている葉に卵塊が付いていることが多い
- 幼虫は頭の後ろに1対の黒い斑紋があり、食欲旺盛である

- 幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- 幼虫は狭い場所を好み、新葉に入る場合もある
- 6月以降、田原・豊橋でフェロモントラップの誘殺量が多い！

おすすめ防除ローテーション

アニキ乳剤

1000~2000倍
収穫3日前まで/3回以内
ハスモンヨトウ・コナガ・アオムシ

コテツフロアブル

2000倍
収穫3日前まで/2回以内
ハスモンヨトウ・コナガなど

アクセルフロアブル

1000~2000倍
収穫前日まで/2回以内
ハスモンヨトウ・ヨトウムシ・コナガなど

ディアナSC

2500~5000倍
収穫前日まで/2回以内
ハスモンヨトウ・コナガ・ハイマダラノメイガなど

その他おすすめ薬剤

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数/ 使用回数
スピノエース 顆粒水和剤	5000倍	3日前まで/3回
カスケード乳剤	4000倍	7日前まで/2回
フェニックス 顆粒水和剤	2000~ 4000倍	前日まで/2回
ランネート45DF	1000倍	7日前まで/2回
フローバックDF	1000倍	前日まで (発生初期) /-
プレオフロアブル	1000倍	7日前まで/2回

シロイチモジヨトウに対しては弊社独自の試験結果で効果のあった薬剤を掲載しています

高温少雨の年はカルシウム欠乏に注意!!

そんな時は **ファイトカル**

500~1000倍

新葉の縁枯れ対策に！
農薬との混用散布もおすすめてです

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません

(肥料登録：生第83188号)



軟弱株の予防

植物の病害抵抗性を向上

エレマックス赤
N-P-K=0-28-26

1000倍

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤
液肥、ホルモン剤との混用は避けてください

