



ハクサイ編



病害虫注意報
2018年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類・軟腐病の防除

高温少雨がが続いているため、チョウ目害虫やアブラムシ類などが多発傾向です。台風の被害を受けると、病害も感染しやすい状態になるのでご注意ください。

チョウ目害虫



コナガ



シロイチモジヨトウ

コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなど

アブラムシ類



軟腐病



薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日	3回
アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
フローバックDF	1,000~2,000倍	前日	-
ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回

薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
モスピラン顆粒水溶剤	2,000~4,000倍	14日前	3回
ウララDF	2,000~3,000倍	前日	2回
コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回
モベントフロアブル	4,000倍	7日前	3回

薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	回数
スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
バリダシン液剤5	500倍	3日前	3回
キノンドーフロアブル	1,000倍	30日前	5回

耕種的防除のポイント

ほ場の排水を良くし、特に雨水が停滞しないようにする
窒素肥料の多用を避け、作物を軟弱にしない

登録拡大 平成29年11月

モベントフロアブル

アブラムシ類

4,000倍 7日前/3回

優れた浸透移行性 残効も長い!



新規登録 平成29年12月

クプロシールド

べと病、斑点細菌病 1,000~2,000倍

軟腐病 1,000~1,500倍 回数制限なし

微粒子化した無機銅が均一に付着!



※結球期以降は、薬害を生じる恐れがあるため結球初期までに使用する。

雨風で傷んだ植物体のケアにおすすめ!

茶葉から抽出した
植物活力資材

カテキンパワー 1,000倍 葉面散布

(肥料登録:生第91402号)

- ・大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
- ・カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめ☆
- ・定植後、高温が続くような時の散布も効果的!

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避けてください。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避けてください。

