



ナス編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年9月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

オオタバコガ・ハスモンヨトウの発生に注意しましょう！

発見が遅く老令幼虫になると薬剤が効きづらくなるので、初期発生時の防除に努めましょう！

	対象病害虫	薬剤名	倍率	使用時期	回数	影響日数	
						マルハナ	ミツバチ
①	ミナキイロアザミウマ マメハダカリハエ ハダニ類・カメムシ類	カスケード乳剤 ※注1	2,000倍	前日	4回	2日	1日
			ミナキイロアザミウマ 2,000～4,000倍 カメムシ類 4,000倍				
	アブラムシ類・アザミウマ類 コナジラミ類・カメムシ類	アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	前日	2回	14日 (ブラック20 日以上)	14日
			コナジラミ類 2,000～3,000倍 アブラムシ類 3,000倍				
②	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病・黒枯病	ダコニール1000	1,000倍	前日	4回	0日	0日
	ハダニ類・チャノホリガニ ミナキイロアザミウマ・オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ・テントウムシダマシ類・ ヨトウムシ・ハスモンヨトウ	コテツフロアブル	2,000倍	前日	4回	9日	10日
③	うどんこ病・すすかび病 灰色かび病	ベルコート水和剤	3000倍	前日	3回	0日	0日
	アザミウマ類・アブラムシ類・ハダニ類・ コナジラミ類・チャノホリガニ	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	45日	1日

※注1 カスケード乳剤使用上の注意 「千両2号」「みず茄子」では果実に薬害が生じる恐れのため使用不可・浸透性を高める効果がある展着剤の加用不可

こんな時こそファイトシリーズの出番

症状	原因	対策①	対策②
成り疲れ	根痛み、同化養分の不足	ファイトメットを灌注施用 150g/反又は2000倍	ファイトオーツ+ファイトカル 2～5日後混合散布 各1000倍
		メット灌水後、数日間空けて液肥の灌水をするより効果的(過湿に注意)	
徒長ぎみ①	高夜温、低温多湿、日照不足	ファイトオーツ+エレマックス赤0-28-26を混用散布	各1000倍
徒長ぎみ②	窒素過多からくる徒長	エレマックス赤0-28-26 500倍液散布	

変更情報

ボタニガード E S

野菜類 ハダニ類 1000倍
発生初期 農薬散布回数なし
100～300リットル/10a

注意：乳剤と混用した場合や夏季高温時に散布した場合に薬害が生じる事があります。

2018年03月28日 付で追加登録されました。



新剤情報

ショウチノスケフロアブル

ガッテン+フルピカの混合剤

使用回数注意

適用病害：
うどんこ病・灰色かび病
2000倍 前日 100～300ℓ/10a
本剤使用回数2回
フルチアニルを含む農薬の総使用回数2回/メバニピリムを含む農薬の総使用回数4回

・新規有効成分フルチアニルとメバニピリムとの混合剤
・Wの効果で既存剤に対して感受性が低下したうどんこ病に対して高い効果を示し耐性菌発達のリスクを抑える
・各種うどんこ病に安定した効果を示すほか、灰色かび病などと同時防除が可能
・残効性に優れることから、1シーズン中のうどんこ病防除回数の低減が期待
・有用昆虫や天敵に対する影響が少なく、IPMI総合的病害虫管理に有用な資材として使用可能

ガッテン乳剤が終了します。切り替えをお願いします。

