



ブロッコリー編

inochio
GROUP

病害虫注意報
2018年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

べと病・黒腐病対策



べと病



黒腐病

症状 葉裏・花蕾などの黒変、汚白色のかび

多発条件 連続する降雨、長時間の植物の濡れ

症状 葉縁のV字型病斑、維管束の黒変

多発条件 低温期の降雨、虫害の酷い圃場(傷口)

防除ローテーション例

ダコニール1000

1000倍（予防）
出蕾前(但し、収穫21日前まで)/2回以内
べと病

クプロシールド

1000～2000倍（予防）
－/－
べと病・黒斑細菌病など

銅パーシ水中和剤

1000倍（予防・治療）
収穫21日前まで/4回以内
黒腐病

シグナムWDG（予防・治療）

1500～2000倍：べと病
1500倍：黒すす病・菌核病
収穫14日前まで/1回

その他おすすめ薬剤

対象病害	薬剤名・特性	希釈倍率	収穫前日数/ 使用回数
べと病	ランマンFL(予)	2000倍	3日前まで/ 3回以内
	レーバスFL(予)	2000倍	7日前まで/ 2回以内
	アミスター 20FL(予・治)	2000倍	3日前まで/ 3回以内
	フォリオゴールド (予・治)	1000倍	出蕾前(但し、 収穫21日前ま で)/2回以内*
黒腐病	キノンドー 水和剤40(予)	800倍	14日前まで/ 3回以内
べと病 黒腐病	ヨネポン水和剤 (予)	500倍	前日まで/ 4回以内

*フォリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

銅パーシ・クプロシールドは花蕾形成期以降は散布不可（薬害）

樹勢維持・病気に負けない株作りに！

カテキンパワー

肥料登録：生第91402号

1000倍

台風後、作物から病原菌を
洗い流すように散布するの
も有効です



混用不可：ストレプトマイシン剤、銅剤、キチン、キトサン類、微生物由来農薬、カルシウム剤（ファイトアルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料

病害登録拡大 2018年6月

シグナムWDG

1500倍/収穫14日前まで/1回
黒すす病

防除薬剤の少ない黒すす病で登録取得！

べと病・黒すす病を同時防除する場合は
1500倍で散布してください

