



キャベツ編



病害虫注意報
2018年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください

コナガ・黒腐病対策



コナガ



黒腐病

被害 薄皮を残した食害 葉脈を残した食害など

症状 葉縁のV字型病斑、維管束の黒変

多発条件 25～30℃の気温 降水量が少ない年

多発条件 低温期の降雨、虫害の酷い圃場(傷口)

おすすめ防除ローテーション

カスケード乳剤
2000～4000倍
収穫7日前まで/2回以内
コナガ・ハスモンヨトウなど

チューンアップ[®]顆粒水和剤
2000～3000倍
発生初期(但し、収穫前日まで)/-
コナガ・アオムシなど

リーフガード顆粒水和剤*
1500倍
収穫7日前まで/3回以内
コナガ・ハイマダラノメイガなど

バリダシン液剤5
800倍
収穫7日前まで/5回以内
黒腐病・軟腐病など

アファーム乳剤
1000～2000倍
収穫前日まで/3回以内
コナガ・ハスモンヨトウなど

クプロシールド*
1000倍
-/ -
黒腐病

スピノエース顆粒水和剤
2500～5000倍
収穫3日前まで/3回以内
コナガ・ヨトウムシなど

フローバックDF
1000～2000倍
発生初期(但し、収穫前日まで)/-
コナガ・アオムシなど

*リーフガードは9月定植は定植後2週間程度は使用を避ける(薬害) クプロシールドは結球期以降散布不可(薬害)

樹勢維持・病気に負けない株作りに！

カテキンパワー

1000倍

台風後、作物から病原菌を
洗い流すように散布するの
も有効です



混用不可：ストレプトマイシン剤、銅剤、キチン、キトサン類、微生物由来農薬、カルシウム剤(ファイトアルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料

軟弱株の予防

植物の病害抵抗性を向上

エレマックス赤

N-P-K=0-28-26

1000倍

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤
液肥、ホルモン剤との混用は避けてください
※カテキンパワーとの混用は可能です

