



キク編



病害虫注意報
2018年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

各種病害虫 (ダニ・アザミウマ・チョウ目類・アブラムシ・白さび病) の発生に注意しましょう!

今月は引き続き様々な種類の病害虫が発生しますので、注意が必要です! これからの時期は各種害虫の発生が多く、また外気温が下がり圃場内への害虫の飛込みが多くなります。特定の病害虫に偏らない防除が必要です。


薬剤散布は“出てから”ではなく、“出る前”に行いましょう!

今月のおすすめローテーション




※地域の防除事例を基に作成しています(輪菊栽培)。品種、栽培条件によっては薬害が発生する場合があります。ご注意ください。さらに、展着剤・葉面散布剤等を加用する場合もご注意ください。


生育初期	アザミウマ類、アブラムシ類 ハダニ類、アブラムシ類	トクチオン乳剤	1,000倍 発生初期/5回
	白さび病	inochioオペラフラワー乳剤	2,000倍 発病初期/3回



破蕾期	アザミウマ類 ハダニ類 アブラムシ類	ディアナSC	2,500~5,000倍 発生初期/2回 ※アブラムシ類は2,500倍	消灯時	アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類	ダントツ水溶剤	生育期株元灌注 4,000倍 発生初期/4回※
	ハダニ	マイトコーネフロアブル	1,000倍 開花前まで/1回		アザミウマ類、ハダニ類、アブラムシ類	※合計4回以内	2,000~4,000倍 発生初期/4回※
	白さび病 うどんこ病 アブラムシ類	ピリカット乳剤	白さび病、アブラムシ類: 1,000倍 うどんこ病: 2,000倍 発病・発生初期/6回		ハダニ類	テデオ乳剤	500~1,000倍 -/1回



発蕾期	アザミウマ類、アブラムシ類	プリンスフロアブル	2,000倍 発生初期/5回
	ハダニ類、アブラムシ類	コロマイト乳剤	1,500倍 -/2回
	白さび病、うどんこ病	アンビルフロアブル	1,000倍 発病初期/7回



登録適用病害が拡大しました!

ダコニール1000

NEW!

適用病害:
うどんこ病、白さび病、斑点病
褐斑病、黒斑病

※2018.06.13 登録適用拡大

1,000倍 -/6回



土壌分析のおすすめ

土壌の化学性を分析し、その結果に基づいた施肥設計を行いましょう!

土質・作物の状態によって作後の土壌に残る養分は異なります。毎作同じ施肥を繰り返していると、特定の養分が不足したり、蓄積したり、土壌の養分バランスが崩れてしまいます。

詳しくは営業担当もしくは下記ホームページまで、お問い合わせ下さい。

生産現場に対応したスピード!

有資格者と現場経験者による分析・検査

分かりやすい報告書!

ホームページ

<http://bunseki.inochio.co.jp>