



レタス編



病害虫注意報
2018年10月作成

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫
注意!

ハスモンヨトウ・オオタバコガ
老齢幼虫は薬剤が効きにくく、防除が難しくなります。
定期防除と幼虫を見かけたら早めの防除を心がけましょう!



病害注意!

すそ枯病・斑点細菌病
曇天が続いたり、突然の大雨などが多くなります。
病気の発生前にしっかり防除することを心がけましょう!

アブラムシ
注意!

アブラムシ
秋口に発生することがあります。新芽などをよく観察しましょう!
特に育苗期にアブラムシ剤を使用していない場合は発生に注意!



定植後～おすすめ防除体系

定植 10日後 20日後 30日後

キノドーフロアブル
800～1000倍
(収穫21日前まで/5回)
※非結球:30日前まで
軟腐病・斑点細菌病・腐敗病
アニキ乳剤
1000～2000倍
(収穫3日前まで/3回)
※非結球:前日まで
オオタバコガ・ハスモンヨトウ

ダコニール1000
1000倍
(収穫14日前まで/3回)
すそ枯病・べと病・灰色かび病
※リーフ:21日前まで/2回/
すそ枯病・べと病
トルネードエースDF
2000倍
(収穫7日前まで/2回)
オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ
※非結球登録あり

バリダシン液剤5
800倍
(収穫7日前まで/3回)
すそ枯病・軟腐病・腐敗病
※非結球レタス登録あり
フェニックス顆粒水和剤
2000～4000倍
(収穫前日まで/2回)
ウワバ類・オオタバコガ・ヨウムシ・ハスモンヨトウ
※非結球登録あり

【アブラムシの発生がある場合】
ランネート45DF
1000～2000倍
(収穫21日前まで/2回)
※非結球登録なし

【アブラムシの発生がある場合】
ウララDF
2000倍
(収穫前日まで/2回)
※非結球:3日前まで

【アブラムシの発生がある場合】
モスピラン顆粒水溶剤
2000～4000倍
(収穫前日まで/3回)
※非結球:4000倍/7日前まで/1回

おすすめ資材

台風や大雨後の樹勢回復対策に!

葉面散布

農薬に混ぜて
洗い流すように
散布すると効果的!
(但し、カテキンパワーと上記薬剤
ではキノドーフとバリダシンは
混用不可)



新規登録農薬

2017年
12月25日
登録追加

トランスフォーム
フロアブル

2000倍

収穫前日まで/3回以内
適用害虫:アブラムシ類

※非結球レタス適用あり

