



ブロッコリー編



病害虫注意報 2022年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



チョウ目害虫対策

ブロッコリーのチョウ目害虫の発生が多くなると予想されています。
高温小雨の時は多発に注意しましょう。



オオタバコガ

- ・幼虫は体色が黒っぽくまばらに生えた毛が目立つ
- ・幼虫は作物に穴をあけて潜り込む性質



シロイチモジヨトウ

- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み新葉に入る場合もある



ハスモンヨトウ

- ・幼虫は卵塊で(数百個)で産卵する
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある
- ・食欲旺盛で集団で食害を起こす

チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

※はなやさい類登録

時期	RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
①	28	コガ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アムシ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
②	30	コガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アムシ 等	ブロフレアSC※	2,000~4,000倍	前日	3回
③	6	コガ・ハスモンヨトウ アムシ	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
④	13	コガ・ハスモンヨトウ ヨウムシ・アムシ	コテツフロアブル	2,000倍	3日前	2回

その他おすすめ薬剤

RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
30	コガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アムシ 等	グレースィア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回
5	コガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・ウバ類 等	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
6	コガ・オタバコガ ヨウムシ・アムシ 等	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
15	ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	3,000倍	7日前	3回

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性で葉までカルシウムを！
グリシンベタイン配合！



肥料登録
生第83188号

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類などの混用は出来ません。

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した
植物活力資材

