



ハクサイ編



病害虫注意報 2022年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類・軟腐病の防除

高温少雨が続き、チョウ目害虫やアブラムシ類などが多発します。台風の被害を受けると、病害も感染しやすい状態になるのでご注意ください。

チョウ目害虫



ハスモンヨトウ

シロイチモジヨトウ

他:コナガ、オオタバコガなど

RACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
30	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
30	グレーシア乳剤	2,000~3,000倍	7日前	2回
6	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	3日前	3回
28	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
5	ディアナSC	2,500~5,000倍	前日	2回
6	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	7日前	3回

アブラムシ類



多発すると葉は萎縮する場合があります。また、ウイルス病の原因となるウイルスを媒介するので、予防的な散布で発生を抑えましょう。

RACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
4A	ダントツ水溶剤	2,000~4,000倍	前日	2回
4A	アルバリン顆粒水溶剤	2,000~3,000倍	3日前	2回
29	ウララDF	2,000~3,000倍	前日	2回
23	モベントフロアブル	4,000倍	7日前	3回
4C	トランスフォームフロアブル	2,000倍	3日前	3回
14	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回
9B	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回

軟腐病



軟腐病は細菌性病害です。台風の被害や害虫の食害痕も感染の原因になります。

RACコード	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
31	スターナ水和剤	1,000倍	7日前	3回
U18	バリダシン液剤5	500倍	3日前	3回
M01	キノドーフロアブル	1,000倍	30日前	5回
M01	クプロシールド	1,000~1,500倍	-	-

耕種的防除
のポイント

- ▶ 圃場の排水を良くし、特に雨水が停滞しないようにする。
- ▶ 窒素肥料の多用、軟弱徒長を避ける。

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性で葉先までカルシウムを！
グリシンベタイン配合！

アミスター、無機銅、ホルモン剤、液肥類などの混用は出来ません。



肥料登録
生第83188号

弱った株の回復に！

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した
植物活力資材

