



# イチゴ編



## 病害虫注意報 2022年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

定植前に徹底防除を行い 圃場への病害虫持ち込みを抑えましょう！

### 育苗～本圃定植時 おすすめローテーション

時期	RAC コード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数		
							ミツバチ	マルハナバチ	ミドリ
9月 ③	1,10	炭疽病・灰色かび病	ニマイバー水和剤	1,000倍	前日	3回	0日		14日
	21A	ハダニ類・コナジラミ類 ワタアブラムシ 等	サンマイトフロアブル <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small>	1,000～ 1,500倍	3日	1回	4日	1～ 4日	30日
定植 まで	23	ハダニ類・アブラムシ類 コナジラミ類・アブラムシ類	モベントフロアブル	500倍 灌注 (ハダニ類・アブラムシ類 は250倍 灌注 登録もあり)	育苗期 後半～ 定植当日	1回	1日	45日	45日
9月 ④	M04	炭疽病・芽枯病 灰色かび病	オーソサイド水和剤80	800倍	14日	5回	1日	0日	0日
	13	ハダニ類・ハスモンヨトウ ミカンキイロアザミウマ シクラメンホリゾタニ	コテツフロアブル <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small>	2,000倍	前日	2回	10日	9日	14日
10月 ①	1,10	炭疽病	ゲッター水和剤	1,000倍	21日	3回	0日	1日	14日
	21A	ハダニ類 チャノホリゾタニ	ダニトロンフロアブル	1,000～ 2,000倍 (チャノホリゾタニは 1,000倍)	前日	1回	1日	1日	14日 14日 以上
10月 ②	7	うどんこ病・灰色かび病 輪斑病	アフエットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日
	6	ハダニ類・ハスモンヨトウ 等	アフアーム乳剤	2,000倍	前日	2回	2日	2日	7日

★いずれの薬剤も高温時・多湿時の散布は控え、その日のうちにきちんと乾かしましょう！

高温対策に！

効果は約1か月

### すずみどり

香り成分で、葉焼けや  
萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10a当たり10～20錠



灌注処理にプラス1！

### ファイトオーツ

1,000倍 灌注処理

同時灌注で効果アップ☆

- ▶ 抵抗性誘導物質の向上
- ▶ 毛細根の充実
- ▶ 徒長防止



肥料登録  
生第83241号

活着不良対策に！

### ファイトメット

100～150g/10aまたは  
2,000～3,000倍灌水

- ▶ 毛細根の充実に！
- ▶ リン酸・ミネラル分の  
吸収アップに！



肥料登録  
輸第84050号