



レタス編



病害虫注意報 2022年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

RACコード	適用病害虫	薬剤名	使用量・希釈倍数・方法	時期	回数	非結球レタス登録
P02	斑点細菌病・腐敗病	オリゼメート粒剤	6～9kg/10a・土壌混和	定植時	1回	○
28	アブラムシ類・オタバコガ ハモグリバエ類・ヨトウムシ ハモシトウ	兼商ヨーバルフロアブル	200倍 0.5L/セルトレイ灌注	育苗期後半～ 定植当日	1回	○
28,4A	アブラムシ類	ミネクトデュオ粒剤	6g/培土L・育苗培土混和	は種前	1回	○
	ヒメフタテヨコバイ		40g/セルトレイ・散布	育苗期後半		
	アブラムシ類・ハモグリバエ類 オタバコガ・ネリムシ類		40g/セルトレイ・散布	は種覆土後 ～育苗期後半		
			1g/株・株元散布	定植時		



注意

ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!

- ・ベリマークSC
- ・ジュリボフロアブル
- ・プリロッソ粒剤オメガ
- ・アクタラ顆粒水溶剤
- ・アクタラ粒剤5
- ・ベネピアOD
- ・アベイル粒剤



★育苗期の病害虫対策

※非結球レタス類は登録内容をご確認の上、ご使用下さい。

RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	非結球レタス登録
M05	すそ枯病・べと病 灰色かび病	ダコニール1000	1,000倍(散布)	14日	3回	リーフ○ (収穫21日前 2回まで 灰色かび病を除く)
U18	すそ枯病・軟腐病 腐敗病	バリダシン液剤5	800倍	前日	3回	○
22A	オタバコガ・ヨトウムシ ハモシトウ	トルネードエースDF	2,000倍	7日前	2回	○
6	ハモグリバエ・オタバコガ ハモシトウ	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回	○

海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオの新しいバイオステミラント！
育苗期の発根促進剤

- ▶ コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶ 海藻エキスによる**発根促進**
- ▶ 転流を促進



肥料登録番号
生第101491号

白酢

POINT 発根を促進し、根張りが向上

育苗期・結球期の
施用がお勧め！

灌注時：100～300倍
散布時：300～1,000倍



※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意