



ブロッコリー編

病害虫注意報 2022年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

今月の病害虫対策

気温が下がるにつれて病害虫（コナガ、ハスモンヨトウ、べと病、黒腐病など）の生育適温となり多発する可能性があります。予防的なローテーション散布を行い、発生前から防除していきましょう。



コナガ

被害

- ▶ 薄皮や葉脈を残した食害

多発条件

- ▶ 25～30℃程度
- ▶ 少雨



べと病

症状

- ▶ 葉裏・花蕾などの黒変
- ▶ 汚白色のかび
- ▶ 収穫期に花蕾や主茎内部に発生する場合もある【組織内べと病】

多発条件

- ▶ 連続する降雨
- ▶ 長時間の植物の濡れ

今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認してから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
10月①	M01	べと病・斑点細菌病 軟腐病	兼商クプロシールド※	1,000～2,000倍 (軟腐病1,000～1,500倍)	—	—
	30	コナガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アムシ等	グレーシア乳剤	2,000～3,000倍	7日前	2回
10月②	11	べと病・黒すす病 菌核病	アミスター20フロアブル	2,000倍	3日前	3回
	6	コナガ・オタバコガ ヨウムシ・アムシ等	アフーム乳剤	1,000～2,000倍	3日前	3回
10月③	U17	べと病	ピシロックフロアブル	1,000倍	前日	2回
	5	コナガ・オタバコガ ハスモンヨトウ・アムシ等	ディアナSC	2,500～5,000倍	前日	2回
10月④	40	べと病	レーバスフロアブル	2,000倍	7日前	2回
	14	コナガ・アブラムシ類	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回

その他べと病おすすめ薬剤

※クプロシールドは花蕾形成期以降は散布不可(薬害)、野菜類登録

薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
ランマンフロアブル	2,000倍	3日前まで	3回
フォリオゴールド※	1,000倍	出蕾前(21日前)	2回

※フォリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は 肥料登録：生第91402号



チップバーンなどの予防に！

ファイトカル

1,000倍 10～14日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号

