



# ハクサイ編

## 病害虫注意報 2022年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### 各種病害虫防除特集

気温が下がるにつれて病害虫ともに生育適温となり、  
白斑病・べと病・アブラムシ類・チョウ目害虫など多発する可能性があります。  
予防的なローテーション散布を行い、発生前からしっかり防除していきましょう。

白斑病



#### 症状

- ▶ 葉の表面に灰褐色の斑点
- ▶ 斑点は拡大し不規則な形となり灰白色、または白色になる

#### 多発条件

- ▶ 比較的低温
- ▶ 多湿

べと病



#### 症状

- ▶ 下葉に淡黄色不正形の病斑を形成
- ▶ 上葉にも発生場合には茎などにも発生

#### 多発条件

- ▶ 18℃前後
- ▶ 多湿

## 今月のおすすめローテーション

対象害虫によって使用の希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数
①	40,49	べと病	<b>予</b> オロンディスウルトラSC	2,000倍	7日前	2回
	30	コガ・ハスモンヨトウ・オタバコガ ダイコンムシ 等	ブロフレアSC	2,000~4,000倍	前日	3回
②	7,11	白斑病・べと病・黒斑病 菌核病・白さび病 炭疽病・尻腐病	<b>予・治</b> シグナムWDG	1,500倍	7日前	3回
	28	アブラムシ類・シイデモンヨトウ コガ・ハスモンヨトウ 等	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	3回
③	7	白斑病・菌核病 黒斑病・尻腐病	<b>予</b> アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回
	9B	アブラムシ類	コルト顆粒水和剤	4,000倍	3日前	3回
④	4,M05	白さび病・べと病 ピシウム腐敗病	<b>予・治</b> フオリオゴールド※	1,000倍	7日前	2回
	14	アブラムシ類・カブムシ類 コガ・ナメジ 類 等	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	7日前	3回

※フオリオゴールドはダコニール1000と合わせて2回まで

弱った株の回復に!

茶葉から抽出した  
植物活力資材

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は 肥料登録: 生第91402号  
避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。



チップバーンなどの予防に!

## ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類との混用は出来ません



肥料登録  
生第83188号