



# イチゴ編

## 病害虫注意報 2022年10月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

☆ 11月中旬までには天敵を導入し、導入後1~2週間は、薬剤散布や葉かきは控えましょう！

# スパスパトリオ

スパイカルEX×1 & スパイデックス×3



天敵混用  
放飼器付き!!

＜天敵混用放飼器のメリット＞

- ・ 1m間隔での「より均一な放飼」が可能
- ・ 放飼作業時間の大幅短縮が可能
- ・ 天敵の株上での増殖開始が早い

## 定植後 おすすめローテーション

天敵導入して2週間以降の  
薬剤散布前には、葉かきを行い  
薬剤のかかりを良くしましょう！

時期	RAC コード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数		
							ミツバチ	マルハナ	ミコ
10月③	-	アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類 登録	1,000倍	前日	-	0日	0日	
	12	炭疽病・黒腐病 灰色かび病	予 セイビアーフロアブル20	1,000倍 (灰色かび病 1,000~1,500倍)	前日	3回	0日	0日	
10月④	25B	ハダニ類	ダニコングフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	3,000倍	前日	1回	1日	0日	
	11	炭疽病・灰色かび病	予 治 ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍 (灰色かび病 2,000~3,000倍)	前日	3回	1日	0日	
11月①	-	アブラムシ類・コナジラミ類 ハダニ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類 登録	1,000倍	前日	-	0日	1日	
	M07	炭疽病・うどんこ病 灰色かび病 等	予 ベルクートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2,000~4,000倍)	前日	5回	0日	0日	
11月②	33	ハダニ類	ダニオーテフロアブル 卵(ハダニ類)に効果あり	2,000倍	前日	2回	0日	0日	
	7	うどんこ病・輪斑病 灰色かび病	予 アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

### ミツバチくん応援資材

## カモンビービー

こんな時にすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量: 6~12パック)



※使用方法など詳細は  
お問い合わせください!!

### 光合成能力UP!

## ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★ 日照不良時の代謝の向上!



肥料登録  
生第87201号