



イチゴ編

病害虫注意報 2022年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫のシーズンとなりましたが、病害虫蔓延を防ぐために初期防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミカド	刊
12月③	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	シグナムWDG	2,000倍 (灰色かび病 1,500~2,000倍)	前日	2回※	0日	0日	-	
	25A	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日	0日		
1月④	9,U13	うどんこ病 灰色かび病	ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日	0日		
	15	アザミワ類 ハシモトウ	マッチ乳剤	アザミワ類： 1,000~2,000倍 ハシモトウ： 3,000倍	前日	4回	1日	0日		
1月②	7	うどんこ病・輪斑病 灰色かび病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	
	25A	ハダニ類 シクラメンホリダニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日	0日		

※カンタスドライブフロアブルとの使用回数注意 対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ **光合成能力UP!**

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

▶糖の転流促進

▶毛細根の充実

▶抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム

+各種微量元素

★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!

★日照不良時の代謝の向上!

⚠ アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などとの混用はさけてください



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

根張り促進や成り疲れ防止

に灌水処理がお勧め!

5~10kg/10a

7~10日おき灌水処理

