



# イチゴ編

病害虫注意報 2023年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## ハダニ防除のポイント



卵の初期と成虫は薬剤の効果  
が不安定で、卵の末期と幼虫は効  
果が安定しやすいです。

→ 卵から成虫が混在する多発  
時は、薬剤をしっかりと効かせるた  
めに、3～5日間隔での薬剤散  
布をオススメします！

## 収穫中 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。  
ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用 時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
3月 ③	7	灰色かび病 うどんこ病 輪斑病	<b>予</b> アフェットフロアブル	2,000倍	前日	3回	0日	1日	0日	
	-	ハダニ類・コナジラミ類 うどんこ病・アブラムシ類	<b>フーモン</b> ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		1日	
4月 ①	U06, 3	うどんこ病	<b>予・治</b> パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	33	ハダニ類	<b>ダニオーテフロアブル</b> 卵にも効果あり	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
4月 ②	34	アザミヤカ類	<b>ファインセーブフロアブル</b>	1,000～ 2,000倍	前日	3回	1日		0日	
	9B	アブラムシ類 コナジラミ類	<b>チェス顆粒水和剤</b>	5,000倍	前日	3回	0日		0日	

萎れ・葉焼け対策に

## ファイトカル

1,000倍 7～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、  
葉先や果実の先までカルシウムを!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート  
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類等との混用は出来ません



肥料登録  
生第83188号

ミツバチくん応援資材

## カモンビービー

こんな時におすすめ!

- 低温や高温でハチが箱から出てこない
- 花が少なくハチが寄り付かない
- ハチが思う様に飛ばない
- 毎年着果不良や奇形果が多い

10パック入り(10a標準使用量:6～12パック)

※使用方法など詳細は  
お問い合わせください!!

