



# スイカ編

病害虫注意報 2023年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## 育苗期・定植時の防除特集

育苗期は苗立枯病が発生しやすいので、過湿にならないように注意しましょう！

<p><b>は種直後</b></p>  <p><b>苗立枯病対策</b>  <b>タチガレン液剤</b> <b>回数注意!</b>            500~1,000倍(は種直後/1回)            希釈液3L/m<sup>2</sup>を苗床灌注</p>	<p><b>本葉2~3葉期</b></p>  <p><b>苗立枯病対策</b>  <b>オーソサイド水和剤80</b> 800倍            (は種後から2~3葉期/5回            /ミヅバチ1日)2L/m<sup>2</sup> 灌注</p>	<p><b>定植前</b></p>  <p><b>害虫対策</b>  <b>モメントフロアブル</b> 500倍灌注            (育苗期後半~定植当日/1回/ミヅバチ1日)            25~50ml/株：アブラムシ類・ナジミ類            50ml/株：ハダニ類・アザミヤカ類</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 害虫・病害の発生に応じて薬剤を散布しましょう！

対象病害虫	RAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 ミヅバチ
アブラムシ類	4A	アルバリン顆粒水溶剤	2,000~3,000倍	7日前	2回	14日
	9B	コルト顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	放飼不可
	29	ウララDF	2,000~4,000倍	前日	2回	0日
	28	兼商ヨーバルフロアブル	2,500~5,000倍	前日	2回	14日
アブラムシ類 +ハダニ類	21A	サンマイトフロアブル	1,000~1,500倍	3日前	2回	4日
ハダニ類	25A	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回	1日
	6	アグリメック	500~1,000倍	前日	3回	14日
炭疽病	M07	ベルコートフロアブル <b>予</b>	1,000倍	前日	4回	0日
	1,10	ゲッター水和剤 <b>予・治</b>	1,500倍	21日前	5回	0日

**光合成能力UP!** 植物本来の力を活性化

**ファイトオーツー** 

▶ 転流量増加 **1,000倍**  
 ▶ 毛細根の充実 **葉面散布**  
 ▶ 抵抗性誘導物質の向上

肥料登録  
生第83241号

**白 酢**

**POINT**

- ◆ 発根を促進し 根張りが向上
- ◆ 固定されたリン酸の吸収を促進
- ◆ 一時的なpHの抑制

灌注時：100~300倍  
 散布時：300~1,000倍

※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意

