



トマト編

病害虫注意報 2023年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓開閉の多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します。また、ハモグリバエ類の発生も増えてきますので発生初期を見逃さず、しっかり防除を行っていきましょう！

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ
3月①	15	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトビダニ等	マッチ乳剤	2,000倍 (ハモグリバエ類1,000倍)	前日	4回	1日
	-	うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日
3月②	6	コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトビダニ・オオハコガ	アファーム乳剤	2,000倍	前日	5回	2日
3月③	5	コナジラミ類・ハモグリバエ類 アブラムシ類・オオハコガ等	ディアナSC	2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍)	前日	2回	1~3日
3月④	21A, 16	コナジラミ類・トマトビダニ	アプロードエースフロアブル	1,000~2,000倍 (トマトビダニ1,000倍)	前日	3回	1日
	-	コナジラミ類・ハダニ類 アブラムシ類・うどんこ病	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日

灰色かび病・うどんこ病対策オススメ剤

RAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハナバチ	登録有無	
						灰色かび病	うどんこ病
7	予 アフェットフロアブル	2,000~4,000倍 (灰色かび病2,000倍)	前日	3回	1日	●	●
7,11	予・治 シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	0日	●	●
9,U13	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日	●	●
50	予 プロパティフロアブル	3,000倍	前日	2回	0日		●
17	予・治 ピクシオDF	2,000倍	前日	4回	1日	●	
12	予 セイビアーフロアブル20	1,000~1,500倍	前日	3回	0日	●	

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性！
グリシン配合の新配合！
尻腐れ果対策にもおすすめです！



アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません

肥料登録
生第83188号

すずみどり

炭酸ガス発生機を導入されている方は
冬からの使用がおすすめ！

A. 香り成分で気孔を強制的に開かせる
→炭酸ガスの吸収をサポート！

暑くないのに
すずみどり？

光合成を活性化させます！

ハウス内に吊るすだけ
効果の持続は約1か月程度 10~20錠 (1~2袋) / 10a

