



# イチゴ編

病害虫注意報 2023年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫も終盤です。最後まで病害虫を蔓延させないために防除を行いましょう！

## 今月のおすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミカ	刊
4月 ③	3	うどんこ病	ラリー乳剤	5,000倍	前日	3回	0日	0日		
	20D	ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	2回	1日	0日		
4月 ④	30	アザミウマ類 ハダニ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日	<b>100日 以上</b>	-	
5月 ①	M03	炭疽病	アントラコール 顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	1日	-	7日	
	I:21A F:39	うどんこ病 アブラムシ類 アザミウマ類 等	ハチハチフロアブル	1,000倍	1番花の 開花まで	1回	5日	5日 以上	<b>40日 以上</b>	
5月 ②	M04	炭疽病 灰色かび病 等	オーソサイド 水和剤80	800倍	14日前	5回	1日	0日	0日	
	13	ミカンハダニ アザミウマ類 等	コテツフロアブル	2,000倍	前日	2回	10日	9日	<b>14日</b>	

**注意！※**

グレーシア乳剤は各種天敵に長期間影響があります。  
天敵放飼中の使用は避けてください。

高温対策に！

効果の持続は約3か月  
放出量は2倍

新登場！

### すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや  
萎れ等の高温障害を予防！  
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ  
10~20本/10a

※手で折り曲げてから  
吊るしてください



萎れ・葉焼け予防に！

### ファイトカル

7~10日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、  
葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート  
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤  
液肥類等との混用は出来ません



肥料登録  
生第83188号