



ミニトマト編

病害虫注意報 2023年4月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



トマトサビダニ・うどんこ病にご注意ください！



トマトサビダニ
被害写真

被害

- ▶ 葉の周縁部が黄褐色になり、裏側へややそり返る
- ▶ 果実は灰褐色に表面が硬化し細かい亀裂が生じる

多発条件

- ▶ 25℃
- ▶ 乾燥条件



うどんこ病
被害写真

症状

- ▶ 主に葉に発生し、葉表・葉裏に白い菌叢を生じる。

多発条件

- ▶ 20～28℃（表生型）
18～25℃（内生型）
- ▶ ハウス内の多湿条件で発病しやすい。
- ▶ 乾燥条件では孢子を飛散し、感染拡大しやすい。

対策

- ▶ 罹病葉・株を除去し、適切に処分する。
- ▶ 適切な肥培管理を行う。
- ▶ 圃場周辺の除草を行う。

今月のおすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
4月①	I:UN F:M10	うどんこ病 トマトサビダニ・コナジラミ類	パルミノ	2,000倍	前日	5回	3～5日
4月②	20D	トマトサビダニ・ハダニ類	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回	1日
	-	うどんこ病・アブラムシ類 コナジラミ類・ハダニ類	フーモン	1,000倍	前日	-	0日
4月③	7,11	うどんこ病・灰色かび病 すすかび病 等	シグナムWDG	2,000倍	前日	2回	0日
	30	コナジラミ類・トマトサビダニ アザミウマ類 等	グレーシア乳剤	2,000倍	前日	2回	1日
4月④	34	トマトサビダニ・アザミウマ類 ハダニコナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)	ファインセーブフロアブル	1,000～2,000倍 (トマトサビダニは 1,000～4,000倍)	前日	3回	1日

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

新登場！

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10～20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



萎れ・葉焼け予防に！

ファイトカル

7～10日おきに葉面散布

▶ 優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを！！

▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類等との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号