



スイートコーン編

病害虫注意報 2023年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫（オオタバコガ・アワノメイガ・ツマジロクサヨトウなど）に注意しましょう！

アブラムシ類は新葉を萎縮させたりする場合があります。他の害虫同様、早めに防除をしましょう。



オオタバコガ



アワノメイガ

Myself (User:Kembangraps), CC BY-SA 3.0
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, ウィキメディア・コモンズ経由で

チョウ目は
中に潜り込んだら
防除が困難です。



アブラムシ類

チョウ目おすすめ農薬

| RAC | 薬剤名 | ヤングコーン登録 (野菜類) | | 未成熟とうもろこし登録 (とうもろこし) | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---|
| | | 対照病害虫 | 希釈倍数 | 対照病害虫 | 希釈倍数 |
| 3A | トレボン乳剤 | — | — | アワノメイガ・アヨトウ ツマジロクサヨトウ | 1,000倍 |
| 4A | アルバリン顆粒水溶 | — | — | アブラムシ類・カメムシ類 | 2,000倍 |
| 4A | モスピラン顆粒水溶剤 | アブラムシ類 | 2,000倍 | アブラムシ類 | 2,000~4000倍 |
| 4C | トランスフォームフロアブル 新規登録拡大！ | — | — | ムギクビレアブラムシ | 2,000倍 |
| 5 | ディアナSC | — | — | アワノメイガ・オオタバコガ | 2,500~5000倍 |
| 6 | アファーム乳剤 | オオタバコガ・ヨトウムシ | 1,000~ 2,000倍 | オオタバコガ・ヨトウムシ ツマジロクサヨトウ | 1,000~2000倍 |
| 13 | コテツフロアブル | オオタバコガ・ツマジロクサ ヨトウ・ハダニ類 | 2,000倍 | オオタバコガ ツマジロクサヨトウ・ハダニ類 | 2,000倍 |
| 22B | アクセルフロアブル | — | — | アワノメイガ ツマジロクサヨトウ | アワノメイガ：1,000~ 2,000倍 ツマジロクサヨトウ：1,000倍 |
| 28 | フェニックス顆粒水和剤 | アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 2,000~ 4,000倍 | アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 2,000~4,000倍 |
| 29 | ウララDF | — | — | アブラムシ類 | 2,000~4,000倍 |
| 30 | グレーシア乳剤 新規登録拡大！ | ハダニ類 | 2,000~ 3,000倍 | ハダニ類 | 2,000~3,000倍 |

とうもろこしは種類によって農薬使用基準が異なります！

スイートコーン

とうもろこし登録もしくは
未成熟とうもろこし登録

ヤングコーン・ハッピーコーン

ヤングコーン登録もしくは
野菜類登録

スイートコーンの収穫前にヤングコーンを収穫する場合は、必ずどちらにも登録されている薬剤を使用して下さい。

※スイートコーンの農薬使用回数には、ヤングコーンで使用した回数を含めて下さい。

収穫前のカメムシ類に注意！

近年、収穫前のスイートコーン果実が
カメムシ類に吸汁される被害が発生しています

カメムシ類特徴

- ▶ 色、形など多種多様
→ 判別がつきにくい
- ▶ 子実部分を吸汁
→ 商品価値がなくなる
- ▶ 雑草に潜んでいたりと、飛ぶ
→ 防除が困難

防除

- ▶ 圃場周辺の雑草防除
 - ▶ 定期的な薬剤散布
 - ▶ **アルバリン顆粒水溶剤**
 - ▶ **スミチオン乳剤**
 - ▶ **カスケード乳剤** (アワノメイガ他同時防除)
 - ▶ **トレボン乳剤** (アワノメイガ他同時防除)
- などがおすすめです！

