



イチゴ編

病害虫注意報 2023年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



苗床での病害虫発生を防ぐためにも 親株床から徹底防除に努めましょう！



親株床おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
						ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
5月③	炭疽病 じゃのめ病	予 ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培期 (但し収穫 76日前)	6回	3日	0日	14日	
	アブラムシ類 ハダニ類	ロディー乳剤	1,000~ 2,000倍	前日	3回	-	14日 以上	60日 以上	84日
5月④	炭疽病	予・治 ゲッター水和剤	1,000倍	収穫開始21 日前	3回	0日	1日	14日	
	うどんこ病 ハダニ類 等	フーモン ※野菜類登録	1,000倍	前日	-	0日		1日	
6月①	炭疽病 等	予・治 アミスター20フロアブル	2,000倍	親株 育成期	3回	0日	1日	0日	
	ハダニ類 等	トクチオン乳剤	1,000倍	75日前	3回	-	1日	30日	
6月②	炭疽病 じゃのめ病	予 ジマンダイセン水和剤	600倍	仮植栽培期 (但し収穫 76日前)	6回	3日	0日	14日	
	ハダニ類	アグリメック	500~ 1,000倍	親株 育成期	2回	14日	7日	7日	

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

新登場！

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



チップバーンなどの予防に！

ファイトカル

1,000倍 10~14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、
葉先や果実の先までカルシウムを！！
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレート
カルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号