




ミニトマト編

病害虫注意報 2023年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

暖かくなると天窓の開閉が多くなり、コナジラミ類の飛び込みが増えます。コナジラミ類が媒介するウイルス病は、発病してしまうと**治療できません**。**感染が疑われる株は速やかに除去**しましょう。
気になる症状は病害虫診断室でお調べします！



黄化葉巻病(TYLCV)

外ハコナジラミ(ハイタイプB,Q)により媒介



- ▶ 芽先が黄化・葉巻症状
- ▶ 節間がつまる

抵抗性品種では
症状の判断が難しい
ので要注意!!

黄化病(ToCV)

コナジラミ類(ハシツ・外ハコ)により媒介



- ▶ 葉脈間の黄化
- ▶ 進行するとえそ症状が発生

中下位葉に出やすく、
マグネシウム欠乏症と
似た症状です。

今月のおすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RACコード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数 マルハバチ
5月 ①	11	灰色かび病・葉かび病 すすかび病 等	ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000~3,000倍	前日	3回	1日
	9B	アブラムシ類 コナジラミ類	チェス顆粒水和剤	5,000倍	前日	3回	0日
5月 ②	U06,3	うどんこ病	パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	前日	2回	0日
	4A	コナジラミ類・アブラムシ類	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回	1日
5月 ③	7	灰色かび病 葉かび病・菌核病	カンタスドライフロアブル	1,000~1,500倍	前日	3回	0日
	6	ミカンキバザミワ コナジラミ類 等	アニキ乳剤	1,000~2,000倍	前日	3回	1日

高温対策に！ 効果の持続は約3か月
放出量は2倍

新登場！

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



軟弱徒長株を強く！

エレマックス赤

0-28-26

1,000倍 葉面散布

- ▶ 樹を締めて徒長防止！
- ▶ 花芽分化・着果(花)の向上に！

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤液肥、ホルモン剤との混用は避ける。
※カテキンパワーとの混用は可能です



肥料登録:
輸第9423号