



# スイカ編

病害虫注意報 2023年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

## つる枯病、アブラムシの発生に注意！

### おすすめ防除ローテーション

交配後2週間は農薬散布を避けましょう！



| 時期 | RAC | 対象病害虫                          | 薬剤名               | 希釈倍数         | 使用時期 | 回数 | 影響日数<br>ミツバチ |
|----|-----|--------------------------------|-------------------|--------------|------|----|--------------|
| ①  | M03 | つる枯病・べと病<br>炭疽病 等 <b>予</b>     | <b>ジマンダイセン水和剤</b> | 400~600倍     | 7日前  | 7回 | 3日           |
|    | 23  | アブラムシ類・コナジラミ類<br>アザミウマ類・ハダニ類   | <b>モベントフロアブル</b>  | 2,000倍       | 前日   | 3回 | 1日           |
| ②  | 3   | つる枯病・炭疽病<br>うどんこ病 <b>予・治</b>   | <b>スコア顆粒水和剤</b>   | 2,000倍       | 前日   | 3回 | 1日           |
|    | 4A  | アブラムシ類・アザミウマ類                  | <b>モスピラン顆粒水溶剤</b> | 2,000~4,000倍 | 3日前  | 3回 | 1日           |
| ③  | 11  | つる枯病・炭疽病<br>菌核病 <b>予</b>       | <b>スクレアフロアブル</b>  | 2,000倍       | 前日   | 3回 | -            |
|    | 9B  | アブラムシ類                         | <b>チェス顆粒水和剤</b>   | 5,000倍       | 3日前  | 4回 | 0日           |
| ④  | M07 | つる枯病・炭疽病<br>うどんこ病・菌核病 <b>予</b> | <b>ベルコートフロアブル</b> | 1,000倍       | 前日   | 4回 | 0日           |
|    | 29  | アブラムシ類                         | <b>ウララDF</b>      | 2,000~4,000倍 | 前日   | 2回 | 0日           |

### うどんこ病・ハダニ対策 おすすめ薬剤

☆詳しい登録内容はラベルの記載をご覧ください

| 対象病害虫   | RAC               | 薬剤名               | 希釈倍数         | 時期  | 回数 | 影響日数<br>ミツバチ |
|---------|-------------------|-------------------|--------------|-----|----|--------------|
| ハダニ類    | 6                 | <b>アグリメック</b>     | 500~1,000倍   | 前日  | 3回 | <b>14日</b>   |
|         | 20B               | <b>カネマイトフロアブル</b> | 1,000~1,500倍 | 前日  | 1回 | 0日           |
|         | 21A               | <b>サンマイトフロアブル</b> | 1,000~1,500倍 | 3日前 | 2回 | 4日           |
|         | 25B               | <b>ダニコングフロアブル</b> | 3,000倍       | 前日  | 1回 | 1日           |
| 果実汚斑細菌病 | 24,M01 <b>予・治</b> | <b>カッパーシン水和剤</b>  | 1,000倍       | 前日  | 5回 | 0日           |

弱った株の回復に！

茶葉から抽出した植物活力資材

## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布！  
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

肥料登録 生第91402号

## 新規農薬登録！

### トランスフォームフロアブル

★微小害虫（アブラムシ類、コナジラミ類）に対して効果を示します！

★浸透移行性、浸達性があります！

アブラムシ類:2,000倍  
コナジラミ類:1,000~2,000倍/収穫前日/3回