



# 長雨・局地的大雨対策編

inochio  
GROUP

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



年々、長雨・局地的大雨による作物被害のリスクは高くなっています。  
被害を受けた後は、速やかな対策をおすすめします！



酸欠を防ぎ、根の動きを促す！

## NEW-SB酸素

浸水による根傷み対策に！

100～200倍

または、10kg/10a 灌注



混用により深層部への効果UP

## 透水プロリキッド

根傷み対策の酸素剤を速やかに  
浸透させるのにおすすめ！

500ml/10a 灌注



### 強い雨風に晒された後のケアにおすすめ！

たっぷりの水量で泥などを洗い落とすイメージで散布しましょう

軟弱徒長株を強く！

弱った株の回復に！

## エレマックス赤

1,000倍 葉面散布



## カテキンパワー

1,000倍 葉面散布



肥料登録  
輸第9423号

「亜りん酸」配合 N-P-K=0-28-26

◎石灰硫黄合剤、アルカリ性農薬、銅剤、液肥、ホルモン剤  
との混用は避ける。



肥料登録  
生第91402号

茶葉から抽出した植物活力資材

◎ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤（ファイトカルを  
除く）、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用不可。  
井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

### 荒天・曇天後の急激な日射による萎れや草勢低下対策に！

施設栽培では遮光と組み合わせた利用もおすすめです

光合成能力UP!

萎れ・葉焼け予防

## ファイトオーツー

1,000倍 葉面散布



## ファイトカル

1,000倍 葉面散布



肥料登録  
生第83241号

酵母由来のアミノ酸  
キトサンオリゴ糖

キレートカルシウム剤  
トレハロース・グリシンベタイン配合

アゾキシストロビン、クレスキシメチル、ボスカリド、無機銅、  
ホルモン剤、液肥類などの混用不可。



肥料登録  
生第83188号

各作物に適用のある殺菌剤との混用散布もおすすめです

被害直後、及びその1週間後の2回散布をおすすめします。