



イチゴ編

病害虫注意報 2023年8月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



育苗期の徹底防除で、本圃への病害虫の持ち込みを防ぎましょう！



ランナー切り離し後 おすすめローテーション②

※ランナー切り離し後から農薬の使用回数のカウントが始まります。
使用時期、使用回数に気を付けてご使用ください

切り離し後から
育苗期が
スタートです！

時期	RAC コード	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハチ	ミヤコ	刊
8月 ③	10,1	炭疽病	ゲッター水和剤	1,000倍	21日前	3回	0日	1日	14日	
	23	アブラムシ類 コガネムシ類 アザミウマ類	モベントフロアブル	2,000倍	前日	3回	1日	30日	45日	
8月 ④	M03	炭疽病	アントラコール顆粒水和剤	500倍	仮植 栽培期	6回	1日	-	7日	
	21A	ハダニ類 等	ピラニカEW	2,000~ 3,000倍	前日	2回	1日	-	30日	
9月 ①	11	炭疽病 等	アミスター20フロアブル	2,000倍	前日	苗床：4回 本圃：3回	0日	1日	0日	
	6	ハダニ類	アグリメック <small>卵(ハダニ類)にも効果あり</small>	500~ 1,000倍	育苗期	2回	14日	7日	7日	
9月 ②	M03,4	疫病	リドミルゴールドMZ	1,000倍	育苗期	3回	-	-	14日	
	-	ハダニ類 コガネムシ類 アブラムシ類 等	フーモン <small>※野菜類登録</small>	1,000倍	前日	-	0日	-	1日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

高温対策に！

効果の持続は約3か月
放出量は2倍

新登場！

すずみどりXL

香り成分で、葉焼けや
萎れ等の高温障害を予防！
更に光合成を向上

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから
吊るしてください



海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオのバイオステュミラント！
育苗期の発根促進にもおすすめ

- ▶ コリンによる光合成促進と発根促進
- ▶ 海藻エキスによる発根促進
- ▶ 転流を促進



肥料登録番号
生第101491号