



ハクサイ編



病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫・アブラムシ類・軟腐病の防除

チョウ目害虫



ハスモンヨトウ

多発条件

- ▶ 20～30℃、多湿条件
- ▶ 隣接圃場など外部からの侵入



シロイチモジヨトウ

多発条件

- ▶ 外部からの飛来・侵入
- ▶ 25～30℃
- ▶ 乾燥

アブラムシ類



多発条件

- ▶ 20～25℃
- ▶ 乾燥
- ▶ 隣接圃場など外部からの侵入

被害

- ▶ 葉の萎れ、縮れ、萎凋する
- ▶ ウイルス病の媒介

軟腐病



症状

- ▶ 水浸状の小さな斑点
- ▶ 悪臭、軟化腐敗
- ▶ 細菌による病害

多発条件

- ▶ 激しい降雨
- ▶ 食害・傷が多い圃場

高温少雨がが続くと、チョウ目害虫やアブラムシ類などが多発します。台風の被害を受けると、病害も感染しやすい状態になるのでご注意ください。

| 順序 | RAC | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 |
|----|-----|--------------------------------|--------------|----------------------------|------|----|
| ① | M01 | 軟腐病、ナメタジ類等 | 予 兼商クプロシールド※ | 1000～1500倍 (ナメタジ類1000倍) | — | — |
| | 5 | コガ・ハスモンヨトウ オタバコガ・アムシ等 | ディアナSC | 2500～5000倍 | 前日 | 2回 |
| ② | 31 | 軟腐病・黒斑細菌病 | 予 スターナ水和剤 | 1000倍 | 7日前 | 3回 |
| | 30 | コガ・ハスモンヨトウ オタバコガ・シロイチモジヨトウ等 | ブロフレアSC | 2000～4000倍 | 前日 | 3回 |
| ③ | U18 | 軟腐病・黒斑細菌病 | 予 バリダシン液剤5 | 500倍 | 3日前 | 3回 |
| | 28 | アブラムシ類・コガ オタバコガ・シロイチモジヨトウ等 | 兼商ヨーバルフロアブル | 2500～5000倍 | 前日 | 3回 |
| ④ | 2 | 白斑病・黒斑病・菌核病 | 予 ロブルール水和剤 | 1000～1500倍 (菌核病1000倍) | 14日前 | 3回 |
| | 4A | アブラムシ類・キジノミムシ ダイコンハムシ | アルバリン顆粒水溶剤 | 2000～3000倍 | 3日前 | 2回 |

※野菜類登録/結球期以降使用不可

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル

10～14日おきに葉面散布

- ▶ 優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを届ける!!
- ▶ 有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有



肥料登録
生第83188号

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません

弱った株の回復に!

カテキンパワー

1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量要素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した
植物活力資材



肥料登録
生第91402号