



カリフラワー編



病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。



チョウ目害虫対策

この時期、チョウ目害虫の発生が多くなると予想されています。特に高温小雨の時は多発に注意しましょう。



オオタバコガ

- ・幼虫は体色が黒っぽいまばらに生えた毛が目立つ
- ・幼虫は作物に穴をあけて潜り込む性質



シロイチモジヨトウ

- ・幼虫は体の側面に白い筋が1本通っている
- ・幼虫は狭い場所を好み新葉に入る場合もある



ハスモンヨトウ

- ・幼虫は卵塊で(数百個)で産卵する
- ・幼虫は背中に1対の黒い斑紋がある
- ・食欲旺盛で集団で食害を起こす

チョウ目害虫おすすめ防除ローテーション

順序	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
①	6	コガ・ハスモンヨトウ	アニキ乳剤	1000~2000倍	前日	3回
②	30	コガ・ハスモンヨトウ アムシ・ネブタミ	グレース乳剤	2000~3000倍	7日前	2回
③	22B	コガ・ヨウムシ・アムシ	アクセルフロアブル	1000倍	前日	2回
④	13	コガ	コテツフロアブル	2000倍	3日前	2回

その他おすすめ薬剤

RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
6	コガ・オタバコガ アムシ・アザミウマ類	アフーム乳剤	1000~2000倍	3日前	3回
11A	オタバコガ・ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ・アムシ コガ・ヨウムシ	ゼンターリ顆粒水和剤※1	1000倍 (アムシ・コガ・ヨウムシ1000~2000倍)	発生初期 (前日)	-
	コガ・アムシ・オタバコガ ハスモンヨトウ・ヨウムシ	フローバックDF※1	1000~2000倍 (オタバコガ・ハスモンヨトウ・ヨウムシ1000倍)	発生初期 (前日)	-
30	コガ・ハスモンヨトウ・アムシ シロイチモジヨトウ・オタバコガ 等	ブロフレアSC※2	2000~4000倍	前日	3回


※1：野菜類登録 ※2：はなやさい類登録

萎れ・葉焼け予防
ファイトカル
10~14日おきに葉面散布

- ▶優れた展着性・浸透性で、葉先までカルシウムを届ける!!
- ▶有機酸とトレハロースによるWキレートカルシウム含有

アミスター、無機銅、ホルモン剤液肥類との混用は出来ません

肥料登録 生第83188号



弱った株の回復に!
カテキンパワー
1,000倍 葉面散布

大雨や強風で植物に傷がついたときに散布!
カビの病気を防ぐ農薬との混用がおすすめです☆

※ストレプトマイシン剤、キチン、キトサン類、カルシウム剤(ファイトカルを除く)、微量元素剤、鉄など金属を含む葉面散布肥料との混用は避ける。井戸水で、鉄分などを多く含む水での使用も避ける。

茶葉から抽出した植物活力資材

肥料登録 生第91402号

