



# レタス編



## 病害虫注意報 2023年9月号

※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

### ☆育苗～定植時のおすすめ粒剤・灌注剤

非結球レタス、リーフレタスもラベルに記載されている詳細な登録内容確認の上、ご使用下さい。

RACコード	適用病害虫	薬剤名	使用量・希釈倍数・方法	時期	回数	非結球レタス登録
P02	斑点細菌病・腐敗病	オリゼメート粒剤	6～9kg/10a 土壌混和	定植時	1回	○
28	アブラムシ類・オタバコガ ハダカニハエ類・ヨトウムシ ハスモンヨトウ	兼商ヨーバルフロアブル	200倍 灌注	育苗期後半～ 定植当日	1回	○
28, 4A	アブラムシ類	ミネクトデュオ粒剤	6g/培土L 育苗培土混和	は種前	1回	×
	ヒメダテコバエ		セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 あたり40g 散布	育苗期後半 は種覆土後～ 育苗期後半		○
	アブラムシ類・ハダカニハエ類 オタバコガ・ネリムシ類					リーフ○
			1g/株 株元散布	定植時		×



### 注意



ミネクトデュオ粒剤を使用した場合、下記の薬剤は苗場での使用ができません!!

- ・ベリマークSC
- ・ジュリボフロアブル
- ・プリロッソ粒剤オメガ
- ・アクタラ顆粒水溶剤
- ・アクタラ粒剤5
- ・ベネビアOD
- ・アベイル粒剤



### ★育苗期の病害虫対策

非結球レタス、リーフレタスもラベルに記載されている詳細な登録内容確認の上、ご使用下さい。

RACコード	適用病害虫	薬剤名	希釈倍数	時期	回数	非結球レタス登録
M05	すそ枯病・べと病 灰色かび病	ダコニール1000	1,000倍(散布)	14日前	3回	リーフ○ (灰色かび病除く)
U18	すそ枯病・軟腐病 腐敗病	バリダシン液剤5	800倍	前日	3回	○
15	オタバコガ	マッチ乳剤	2,000倍	3日前	3回	○
6	オタバコガ・ハスモンヨトウ シイハダヨトウ	アニキ乳剤	1,000～ 2,000倍	3日前	3回	○ (シイハダヨトウ除く)

## 海藻サンバ

育苗期・生育期:1,000倍

イノチオのバイオスティミュラント!  
育苗期の発根促進剤

- ▶ コリンによる**光合成促進**と**発根促進**
- ▶ 海藻エキスによる**発根促進**
- ▶ 転流を促進



肥料登録番号  
生第101491号

## 白酢

POINT 発根を促進し、根張りが向上

育苗期・結球期の  
施用がお勧め!

灌注: 100～300倍  
散布: 300～1,000倍

※強酸性のため100倍より濃く希釈しないように注意

