



イチゴ編

病害虫注意報 2023年11月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

天敵導入後1～2週間は、定着させるために薬剤散布や葉かきは控えましょう！

天敵導入後は、影響日数の短い薬剤を選択してください。

天敵を導入して2週間以降の薬剤散布の前には、葉かきを行い、薬剤のかかりを良くしましょう。

天敵導入後 おすすめローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミヤコ	刊
11月③	9,U13	灰色かび病 うどんこ病	🟡 予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	25A	ハダニ類 シラメンホリガニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	
	10A	ハダニ類 (ハダニ類の多発時は追加)	ニツソラン水和剤 卵にも効果あり	2,000～ 3,000倍	前日	2回	0日	1日	0日	
12月①	2	灰色かび病	🟡 予 ロブラールくん煙剤	100g (50g×2個)/ 300～400㎡	前日	4回	1日		0日	
	または									
	2	灰色かび病	🟡 予 ロブラール500アクア	1,000～ 1,500倍	前日	4回	1日		0日	
	20D	ハダニ類	マイトコーネフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
12月②	M07	うどんこ病・黒斑病 炭疽病 灰色かび病	🟡 予 ベルクートフロアブル	2,000倍 (うどんこ病 2,000～4,000 倍)	前日 (生育期)	5回	0日		0日	
	25B	ハダニ類	ダニコングフロアブル 卵にも効果あり	3,000倍	前日	1回	1日		0日	

★ いずれの薬剤も、高温時・多湿時の散布は控えその日のうちにきちんと乾かしましょう！

サフオイル乳剤

- 気門封鎖剤なので、他剤の感受性低下害虫に有効
- ハダニ類の全ステージに有効（殺卵効果あり）

適用内容（抜粋）

300～500倍/ 収穫前日まで / ハダニ類

※展着剤の加用を推奨

※高温時は薬害の恐れがあり、使用を避ける



光合成能力UP！

ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

キレートマグネシウム+各種微量元素

★ 葉にテリ・ツヤ・厚みUP！

★ 日照不良時の代謝の向上！



肥料登録
生第87201号