



イチゴ編

病害虫注意報 2023年12月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

収穫のシーズンとなりましたが、病害虫蔓延を防ぐために初期防除を心がけましょう！

収穫中 おすすめローテーション

時期	RAC	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	使用時期	回数	影響日数			
							ミツバチ	マルハナ	ミカド	刊
12月③	7,11	うどんこ病・炭疽病 灰色かび病	予・治 シグナムWDG※	2,000倍 灰色かび病1,500 ~2,000倍	前日	2回	0日	-	0日	-
	25A	ハダニ類	ダニサラバフロアブル 卵にも効果あり	1,000倍	前日	2回	1日		0日	
1月①	9,U13	うどんこ病 灰色かび病	予・治 ショウチノスケフロアブル	2,000倍	前日	2回	0日		0日	
	15	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	マッチ乳剤	アザミウマ類1,000~ 2,000倍 ハスモンヨトウ3,000倍	前日	4回	1日	0日	0日	
1月②	7	うどんこ病 灰色かび病	予 ケンジャフロアブル	1,500倍	前日	3回	1日		0日	
	25A	ハダニ類 シクラメンホコリダニ	スターマイトフロアブル 卵(ハダニ類)にも効果あり	2,000倍	前日	2回	1日		0日	

※カンタスドライフロアブルとの使用回数注意 対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。ラベルの確認をしてから使用してください。

厳寒期対策おすすめ資材

植物本来の力を活性化！ **光合成能力UP!**

ファイトオーツ- & ファイトマジック

1,000倍 葉面散布

1,000倍 葉面散布

植物本来の力を活性化☆

- ▶糖の転流促進
- ▶毛細根の充実
- ▶抵抗性誘導物質の向上

キレートマグネシウム
+各種微量元素

- ★葉にテリ・ツヤ・厚みUP!
- ★日照不良時の代謝の向上!



肥料登録 生第83241号 肥料登録 生第87201号

⚠ アルカリ性農薬、石灰硫黄合剤、アゾキシストロビン剤(アミスター)、クレソキシムメチル剤(ストロビー)、無機銅剤、ホルモン剤、液肥類などの混用はさけてください

おすすめ資材

酸欠を防ぎ根の動きを促す!

NEW-SB酸素

初期の活着時や高温期に
灌水処理がお勧め!



5~10kg/10a
7~10日おき灌水処理