



トマト編

病害虫注意報 2024年3月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

コナジラミ類・ハモグリバエ類 対策

天窓を開くことも多くなる2月後半からコナジラミ類が増加します。
ハモグリバエ類も増えてきますので発生初期からしっかり防除を行っていきましょう！

おすすめ防除ローテーション

対象病害虫によって希釈倍数が異なる場合があります。
ラベルの確認をしてから使用してください。

| 時期 | RAC | 対象病害虫 | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ |
|-----|---------|---|---------------|---------------------------------|------|----|---------------|
| 3月① | 15 | コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ等 | マッチ乳剤 | 2,000倍 (ハモグリバエ類1,000倍) | 前日 | 4回 | 0日 |
| | - | うどんこ病・ハダニ類 コナジラミ類・アブラムシ類 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 |
| 3月② | 6 | コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトヒゲナシ・オタバコ トマトバガ | アファーム乳剤 | 2,000倍 | 前日 | 5回 | 2日 |
| 3月③ | 5 | コナジラミ類・ハモグリバエ類 トマトバガ・オタバコ等 | ディアナSC | 2,500~5,000倍 (コナジラミ類2,500倍) | 前日 | 2回 | 1日 |
| 3月④ | 21A, 16 | コナジラミ類・トマトヒゲナシ | アプロードエースフロアブル | 1,000~2,000倍 (トマトヒゲナシ1,000倍) | 前日 | 3回 | - |
| | - | コナジラミ類・ハダニ類 アブラムシ類・うどんこ病 | フーモン ※野菜類登録 | 1,000倍 | 前日 | - | 0日 |

灰色かび病・うどんこ病対策オススメ剤

| RAC | 薬剤名 | 希釈倍数 | 使用時期 | 回数 | 影響日数 マルハバチ | 登録有無 | |
|-------|------------------|--------------|------|----|---------------|-------|-------|
| | | | | | | 灰色かび病 | うどんこ病 |
| 7 | 予 ケンジャフロアブル | 1,500倍 | 前日 | 3回 | 1日 | ● | ● |
| M07 | 予 ベルクートフロアブル | 2,000~4,000倍 | 前日 | 3回 | 0日 | ● | ● |
| 9,U13 | 予・治 ショウチノスケフロアブル | 2,000倍 | 前日 | 2回 | 0日 | ● | ● |
| M10 | 予 パルミノ | 2,000倍 | 前日 | 5回 | 1日 (クロマル) | | ● |
| 17 | 予・治 ピクシオDF | 2,000倍 | 前日 | 4回 | 1日 | ● | |
| 52 | 予 ミギワ10フロアブル | 1,000倍 | 前日 | 3回 | 1日 | ● | |

萎れ・葉焼け予防

ファイトカル 1,000倍 葉面散布

優れた展着性と浸透性！
グリシンバタイン新配合！
尻腐れ果対策にもおすすめです！

アミスター、無機銅、ホルモン剤
液肥類との混用は出来ません



肥料登録
生第83188号

すずみどりXL

なぜ暑くないのに
すずみどり？

ハウス内に吊るすだけ
10~20本/10a

※手で折り曲げてから吊るしてください



二酸化炭素発生機を導入されている方は
高温期以外の使用もおすすめ！

A. 香り成分で気孔を強制的に開かせる
→二酸化炭素の吸収をサポート！

光合成を促進させます！

効果の持続は約3か月

