



スイートコーン編

病害虫注意報 2024年5月号



※農薬の使用はラベルの記載に従ってください。

チョウ目害虫（オオタバコガ、アワノメイガなど）やアブラムシ類に注意しましょう。
発生前から予防的に防除し、茎葉や収穫部位への侵入を防ぎましょう。



オオタバコガ



アワノメイガ

Myself (User:Kembangraps), CC BY-SA 3.0
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, ウィキメディア・コモンズ経由で



アブラムシ類



おすすめ防除農薬一覧

RAC	薬剤名	ヤングコーン登録 (野菜類)		未成熟とうもろこし登録 (とうもろこし)	
		対象病害虫	希釈倍数	対象病害虫	希釈倍数
3A	トレボン乳剤	—	—	アワノメイガ・アヨトリ ツマジロクサヨトウ	1,000倍
4A	アルバリン顆粒水溶剤	—	—	アブラムシ類・カメムシ類	2,000倍
4A	モスピラン顆粒水溶剤	アブラムシ類	2,000倍	アブラムシ類	2,000～4,000倍
4C	トランスフォームフロアブル	—	—	アブラムシ類	2,000倍
5	ディアナSC	—	—	アワノメイガ・オオタバコガ	2,500～5,000倍
6	アフーム乳剤	オオタバコガ・ヨトウムシ	1,000～ 2,000倍	オオタバコガ・ヨトウムシ ツマジロクサヨトウ	1,000～2,000倍
13	コテツフロアブル	ハダニ類・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000倍	ハダニ類・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000倍
28	兼商ヨーバルフロアブル	—	—	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	5,000倍
	フェニックス顆粒水和剤	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000～ 4,000倍	アワノメイガ・オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	2,000～4,000倍
29	ウララDF	—	—	アブラムシ類	2,000～4,000倍
30	グレーシア乳剤	ハダニ類	2,000～ 3,000倍	ハダニ類	2,000～3,000倍

ブルーシアフロアブル

一年生イネ科・広葉雑草に優れた効果！

一年生雑草

とうもろこし3～5葉期(45日前)
1回 40～50ml/100L/10a
雑草茎葉散布または全面散布



※ヤングコーンを出荷する場合は使用不可
※他にも使用時期が異なる登録がありますので、
ラベルをご確認ください。

収穫前のカメムシ類に注意！

近年、収穫前のスイートコーン果実が
カメムシ類に吸汁される被害が発生しています

カメムシ類特徴

- ▶色、形など多種多様
→判別がつきにくい
- ▶子実部分を吸汁
→商品価値がなくなる
- ▶雑草に潜んでいたり、飛ぶ
→防除が困難

防除

- ▶圃場周辺の雑草防除
 - ▶定期的な薬剤散布
- ➡
- アルバリン顆粒水溶剤
 - スミチオン乳剤
 - カスケード乳剤 (アワノメイガ他同時防除)
 - トレボン乳剤 (アワノメイガ他同時防除)
- などがおすすめです！

